


Verkrijgbaar bij den Plantenziektenkundigen Dienst.

PRIJS 10.40

Franco p. p.

VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST  
TE WAGENINGEN, No. 33.



# SPROEIEN EN SPROEIERS

---

VIJFDE HERZIENE DRUK

---

APRIL 1935

DRUK: H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN



## SPROEIEN EN SPROEIERS

## INHOUD

Inleiding .....	3
I. Ziekten en beschadigingen:	
oofgewassen .....	4
boomkweekerijgewassen .....	12
bloemgewassen .....	18
groenten .....	19
landbouwgewassen .....	21
II. Sproeimiddelen: .....	23
contactgiften .....	24
maaggiften .....	29
ademhalings- en zenuwgiften .....	31
fungiciden .....	32
uitvloeiers .....	36
III. Uitvoering der bespuitingen .....	38
IV. Sproeiwerktuigen .....	40
V. Berekening der spuitkosten .....	55
Verklaring der afbeeldingen .....	60



## SPROEIEIEN EN SPROEIERIERS

Een der belangrijkste methoden voor de bestrijding van plantenziekten is het sproeien, d.w.z. het aanwenden van bestrijdingsmiddelen in vloeibaren, opgelosten of wel zwevendenden, toestand.

Voor den land- en tuinbouwer, die sproeimiddelen zal aanwenden, is het van het meeste belang, dat hij weet:

- 1°. of er ziekten in zijn gewassen voorkomen, die met sproeimiddelen voorkomen of bestreden kunnen worden;
- 2°. met welke middelen deze voorkomen of bestreden kunnen worden;
- 3°. hoe deze middelen worden aangewend en wanneer;
- 4°. welke werktuigen daarbij kunnen worden gebruikt.

Slechts indien hij deze kennis bezit, kan hij een doelbewuste en rationeele bestrijding toepassen en alleen deze kan op den duur loonend zijn. Dit boekje heeft tot doel aan allen, die daaraan behoefte hebben, aanwijzingen te verschaffen over de gevallen, waarin een bespuiting <sup>1)</sup> ter bestrijding van plantenziekten kan worden aangewend, de middelen te leeren kennen, die daarbij kunnen worden toegepast en de wijze aan te geven, waarop de bespuiting moet worden uitgevoerd. Voor uitvoerige beschrijvingen over ziekten en beschadigingen en de te gebruiken bestrijdingsmiddelen zij, voor zoover dit niet reeds geschied is, verwezen naar de lijst van Mededeelingen en Vlugschriften, voorkomende op den omslag. In alle gevallen, waarin men hulp en voorlichting wenscht te ontvangen omtrent de wenschelijkheid of noodzakelijkheid eener bespuiting en over de uitvoering, wende men zich tot den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen of tot een der buiten Wageningen werkzaam gestelde ambtenaren.

---

<sup>1)</sup> Uitdrukkelijk zij er op gewezen, dat hier uitsluitend sproeimiddelen worden aangegeven. Indien de hier aangeduide ziekten ook door andere (b.v. bestuivingen) kunnen worden bestreden, is dit in deze brochure (met slechts enkele uitzonderingen) niet aangegeven.

# I. WELKE ZIEKTEN OF BESCHADIGINGEN KUNNEN DOOR EEN BESPROEIJING VOORKOMEN OF BESTREDEN WORDEN?

## OFTBOOMEN EN -STRUIKEN

### Appel

**Schurft.** Het blad wordt, hoofdzakelijk aan de bovenzijde, gedeeltelijk bedekt met een olijfgroen laagje. Op de vruchten ontstaan bruinzwarte vlekken.

Ter bestrijding zijn eenige bespuitingen noodig, nl.

a. met 1½% Bordeauxsche pap of een der goede vervangmiddelen korten tijd vóór den bloei. Gevoelige soorten als goudreinet en andere (zie Mededeeling 50, blz. 20) wat vroeger bespuiten, nl. als de knoppen flink gezwollen zijn.

b. met 1¼% Californische pap direct na den bloei; wenscht men tevens de wormstekigheid te bestrijden, dan moet loodarsenaat aan de vloeistof worden toegevoegd (zie Mededeeling 20).

c. een derde bespuiting, welke nog wel eens achterwege blijft, maar toch hoognoodig is, moet 3 à 4 weken na de tweede worden uitgevoerd. Nu gebruikt men 1% Californische pap.

Voor het telen van zeer mooi fruit zijn drie bespuitingen dikwijls niet voldoende, vele fruittelers sproeien wel vijf, zes en meer keeren. Voor deze latere bespuitingen gebruikt men 1 à ¾% Californische pap.

De tijdstippen voor de bespuitingen kunnen niet nauwkeurig opgegeven worden, daar zij met het weer verband houden. Men raadplege ook de Mededeelingen 50 en 73.

**Meeldauw.** Jonge scheuten en bladeren worden met een wit melig laagje zwamweefsel bedekt. De bladeren krullen en verdorven, de aangetaste scheuten sterven af.

Kort vóór den bloei spuiten met Californische pap (1 deel pap + 25 deelen water. Een latere bespuiting met 1 deel pap op 80 deelen water, zoodra de meeldauw zich vertoont, verdient eveneens aanbeveling.

**Moniliaziekte.** Zie voor bestrijding bij pruim.

**Schildluizen.** Op stammen en takken komen de luizen voor, welke onder een rond, komma- of mosselvormig schildje verborgen zijn.

Winterbespuiting (Febr., Maart) met 7½% carbolineum of 8-10% van een minerale-oliepreparaat.

**Bladluizen.** De luizen zuigen aan de onderzijde der bladeren,

waardoor deze gaan krullen, jonge scheutjes groeien soms krom en de vruchten blijven klein. 's Winters komen de glimmende zwarte eitjes op stammen en takken, meestal bij de knoppen, voor.

Winterbespuiting met 6 à 7½% carbolineum.

**Bloedluis.** In oude wonden en spleten aan stam en takken vertoonen zich witte donzige plekjes. Bij sterke aantasting zijn de éénjarige scheuten voor een groot deel met deze witte hoopjes bedekt, op de aangetaste plekken ontstaan ook kankerachtige knobbels.

Een carbolineumbespuiting geeft geen bevredigende resultaten. Beter zijn winterbespuitingen met minerale-oliepreparaten 8-10%, in den zomer, bij het eerste optreden van bloedluis, gevolgd door nicotinebespuitingen (1 : 1000 nicotine + uitvloeier).

**Appelwants.** Bladeren vertoonen gaten en scheuren, vruchten krijgen verkurkte vlekken en bobbels. Op de eenjarige twijgen wordt pleksgewijs de bast beschadigd, boven de beschadigde plek is de tak gedrongen, daar staan de knoppen dichter dan gewoonlijk bij elkander.

Winterbespuiting met 10% van een speciaal voor dit doel vervaardigde carbolineumsoort of met 8% van een minerale-oliepreparaat. Men moet niet zuinig met de vloeistof zijn.

Zeer goede resultaten worden ook verkregen door ongeveer 10 dagen voordat de appels in vollen bloei staan, te spuiten met nicotine (1 deel zuivere nicotine op 1000 à 1500 deelen water). Aan de vloeistof dient een uitvloeier te worden toegevoegd.

**Spint.** Deze plaag kan veroorzaakt worden door tot verschillende geslachten behorende mijtsoorten, welke hoofdzakelijk aan de onderzijde der bladeren leven.

De mijten worden door een carbolineumbespuiting niet afdoende bestreden, vooral niet wanneer zeer vroeg wordt gespoten. Het beste resultaat wordt verkregen, wanneer gespoten wordt zoo laat in den tijd, als de ontwikkeling der boomen toelaat. Men zij echter voorzichtig met het zoo lang mogelijk uitstellen der bespuiting, want als het dan in de laatste weken ongunstig weer is, moet de bespuiting heelemaal worden nagelaten.

Er wordt reeds gebruik gemaakt van carbolineum, waaraan een minerale-oliepreparaat toegevoegd is. Door deze toevoeging wordt de werking tegen spint verhoogd. Beter is het echter twee bespuitingen uit te voeren, nl. midden Februari met 6% carbolineum en begin Maart met 6 à 8% van een minerale-oliepreparaat.

Een der oudste methoden is een bespuiting in het begin van



den zomer met een zwavelleveroplossing ( $0,4\% = 4$  gram zwavellever per liter water) met tarwebloempap; in plaats van tarwebloem gebruikt men nu een uitvloeier.

Ook bespuitingen met andere zwavelpreparaten, b.v. Californische pap 1 : 80, gaan uitbreiding van spintaantasting tegen. Beter nog werken petroleumpreparaten, doch deze kunnen niet gebruikt worden als er ook met Californische pap gespoten wordt; dan volgt bladverbranding en vruchtval.

**Wormstekigheid.** Een rupsje vreet het klokhuis en omgeving uit, meestal dringt het door de kelkholte naar binnen. (Niet te verwarren met de larve der appelzaagwesp, zie Med. 20).

Direct na den bloei (voordat de kelkblaadjes de kelkholte afsluiten)  $0,3\%$  poedervormig of  $0,5\%$  pasta-vormig loodarsenaat;  $1\%$  kalk toevoegen met het oog op bladverbranding.

**Appelzaagwesp.** De larven van deze wesp komen reeds vroeg in den zomer in de appels voor en veroorzaken ook een vorm van wormstekigheid. De wormstekige appels, die in Juni en begin Juli vallen, zijn vrijwel uitsluitend door de appelzaagwesplarven aangetast.

Door een bespuiting met nicotine (1 deel op 1000 à 1250 deelen water) waaraan een uitvloeier is toegevoegd, binnen een week na het vallen der bloemblaadjes, kan de beschadiging voor een groot deel voorkomen worden.

**Trekmade.** (rups van den kleinen wintervlinder). Groenachtige rupsjes vreten blad- en bloemknoppen. In de bladeren worden vrij groote gaten gevreten, ook jonge vruchtjes worden beschadigd.

Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum. Zoodra vreterij wordt waargenomen, spuiten met  $0,3\%$  poedervormig of  $0,5\%$  pastavormig loodarsenaat (bekend is de bestrijding door middel van lijmbanden, zie Med. No 3). Het gedeelte van den stam beneden de lijmbanden moet in het voorjaar met  $10\%$  carbolineum bespoten worden om de eitjes, welke daar zijn gelegd, te dooden.

**Bladvloo.** Kleine, groene, eenigszins op bladluizen gelijkende insecten zuigen reeds aan de juist ontluikende knoppen, waardoor de vruchtzetting sterk belemmerd kan worden. Ook de bladeren worden misvormd (kroes).

De overwinterende eieren worden door een winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum gedood. In den zomer geven bespuitingen met nicotinepreparaten goede resultaten.

**Wieren en Korstmossen.** De op stam en takken van oudere, soms ook van jonge, boomen voorkomende wieren (groen) en korstmossen (grijs) worden gedood door een bespuiting met een  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineumoplossing in den winter.



## Peer

**Schurft.** Vlekjes op de bladeren kleiner dan bij appel, vruchten met vlekken en meermalen gebarsten, behandeling als bij appel.

Besputting met Californische pap mag niet bij fellen zonneschijn plaats hebben wegens gevaar voor bladverbranding, liefst niet meer dan 1% gebruiken.

In plaats van Californische pap kan bij de meeste soorten voor de tweede en latere besputtingen ook  $\frac{3}{4}$ % Bordeauxsche pap gebruikt worden.

**Moniliaziekte.** Zie voor bestrijding bij pruim.

**Pokziekte.** Aanvankelijk groene of roode, later bruine opzwellingen op de bladeren, in den regel langs de hoofdnerf.

Tegen het uitloopen der knoppen spuiten met Californische pap (1 deel pap en 9 deelen water) of met  $7\frac{1}{2}$ % carbolineumoplossing.

**Spint.** Zie bij appel.

**Schildluizen.** Als bij appel.

**Wormstekigheid.** Zelfde behandeling als bij appel.

**Trekmade.** Zie bij appel.

**Wantsen.** Uitwendige steenigheid (lithiasis) wordt vermoedelijk door een wants (*Calocoris fulvomaculatus*) veroorzaakt. Besputtingen met nicotine 1 : 1000 + uitvloeier, direct na den bloei, hebben goede resultaten opgeleverd.

Ook winterbesputtingen met minerale oliën kunnen worden aanbevolen.

## Pruim

**Moniliaziekte.** In het voorjaar worden plotseling geheele takken tijdens of na den bloei bruin en sterven af. De vruchten rotten aan den boom en worden met geelgrijze zwamkussentjes bedekt. Een besputting met een  $7\frac{1}{2}$ % carbolineumoplossing in den winter heeft in verschillende gevallen een zeer gunstig resultaat opgeleverd. Een besputting met 1 à  $1\frac{1}{2}$ % Bordeauxsche pap, kort vóór het uitloopen der knoppen, heeft ook uitstekend voldaan.

**Bladluizen.** Er komen twee soorten luizen voor: gewone, die de bladeren door hun zuigen kroes maken en wit bepoederde, welke de bladeren niet doen omkrullen.

Winterbesputting (Jan.-Febr.) met 6 à  $7\frac{1}{2}$ % carbolineum.

Tegen de witbepoederde luis kan men zomers ook met zeepspiritus, met nicotine of met andere insecticiden, b.v. derris preparaten spuiten.

**Trekmade.** Als bij appel en peer.

**Pruimezaagwesp.** De larven boren zich in de pas gezette vruchten in en vreten de nog week kern op. Vaak verlaten zij de eene vrucht om andere aan te tasten.

Tweemaal spuiten met een maagvergif (0,5% poedervormig loodarsenaat), direct na den bloei en 8-14 dagen later.

Bij sommige soorten, o.a. kwetsen en Eldensche blauwe, kan loodarsenaat niet gebruikt worden wegens ernstige bladverbranding.

Zeer goede resultaten zijn verkregen door bespuitingen met nicotine (1 : 1000) + uitvloeier. Gespoten moet worden eenige dagen nadat de eitjes zijn gelegd, kenbaar aan bruine stippen op de kelkblaadjes. Behalve nicotine zijn ook andere insecticiden (derris preparaten) bruikbaar.

**Spint.** Zie bij appel.

### Perzik

**Krulziekte.** Bladeren blaasvormig, bultig opgezwollen en gekromd, kleur geelgroen, ook wel roodachtig. Aangetaste bladeren worden met een wit fluweelachtig waas bedekt.

Enkele weken voor het uitloopen der bloemknoppen spuiten met Californische pap (1 deel pap + 12 deelen water).

**Dopluizen.** De luizen, later de eitjes, zijn met een bolrond, notedopachtig schild bedekt. Bij sommige soorten zijn de eitjes gehuld in een wasachtige massa, die van onder het schild te voorschijn komt.

Perziken in de kas spuiten met 5% carbolineum (Dec.).

Sommige kweekers spuiten eenige uren na de carbolineumbespuiting na met schoon water. Om verbranding der knoppen te voorkomen, is dit wel gewenscht.

Bij perziken buiten kan de bespuiting later (Jan.) uitgevoerd worden.

**Bladluizen.** Bladeren sterk gekroesd en bobbelig. De toppen der jonge scheutjes sterven af.

Winterbehandeling met 5% carbolineum, in de kas in Dec., buiten in Jan. Naspuiten met water gewenscht.

**Spint.** Kleine witte vlekjes op de bladeren, het blad krijgt een grauwe tot bruinachtige kleur.

Winterbehandeling met 6% van een minerale-oliepreparaat.

's Zomers kan daarop een bespuiting met een zomer-oliepreparaat volgen.

### Kers

**Monilia.** Bloesem sterft plotseling, later volgen de éénjarige twijgen, vruchten verdrogen.

Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  vruchtboomcarbolineum, gevolgd door een bespuiting met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap als de knoppen beginnen te zwellen.

**Trekmade.** Zie bij appel en peer.

**Bladluizen.** Zie bij appel en peer.

### Aalbessen

**Bladvalziekte.** Kleine geelbruine vlekjes op het blad. Later vloeien de vlekjes samen tot groote vlekken, het blad valt spoedig af.

Winterbespuiting met  $10\%$  carbolineum.

Voorjaarsbespuiting vlak na den bloei met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap, herhalen direct na den pluk.

**Bladluizen.** Op roode en witte aalbessen komen verscheidene soorten luizen voor. Eén soort veroorzaakt roode opzwellingen aan de bovenzijde van het blad, een andere soort tast vooral de bladeren in den top van de scheuten aan. Deze bladeren worden sterk gekroesd (kroeskoppen). De scheuten zelf krommen zich soms vrij sterk.

Beide soorten worden bestreden met een carbolineum-bespuiting ( $7\frac{1}{2}\%$ ) in den winter (Jan.-Febr.).

**Wantsen.** Op een aangetast blad zijn kleine gaatjes onregelmatig verspreid. Kleine stukjes blad tusschen een groot aantal gaatjes vallen uit en ook ontstaan gemakkelijk scheuren in het blad. De groei der scheuten wordt min of meer gestremd en soms vindt men dicht bij den top daarvan aan één zijde een vrij groote holte, terwijl het takje daar veelal eenigszins verbreed en afgeplat is.

Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum niet afdoende, betere resultaten met speciaal voor dit doel bereide carbolineum of met minerale-olie-preparaten.

**Bessenbladwesp.** De bastaardrupsjes, grijsgroen van kleur met zwarte kop en zwarte wratjes op het lichaam, vreten aan de randen der bladeren, waarvan alleen de nerven overblijven.

Zoodra vreterij waargenomen wordt, spuiten met  $0,3\%$  poedervormig of  $0,5\%$  pastavormig loodarsenaat of met  $1\frac{1}{2}\%$  bariumchloride; niet spuiten tijdens den bloei met het oog op vergiftiging van bijen. Zie blz. 30 en 31.

Daar de bastaardrupsjes in den grond overwinteren, kunnen zij door bespuiting in den winter niet bestreden worden.

**Bessenspruitvreter.** In het voorjaar dringen kleine rupsjes in de knoppen en vreten deze uit, later boren zij zich ook in jonge scheutjes, die dan afsterven.



Winterbespuiting (Febr.) met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum is afdoende.  
**Trekmade.** (wintervlinder). Zie bij appel en peer.

### Zwarte bessen

**Bladvalziekte.** Zie bij aalbessen.

**Rondknop.** De door de mijten bewoonde knoppen zwellen sterk op, doch loopen in het voorjaar niet of onvolkomen uit. Vooral in het voorjaar verspreiden zich de mijten.

Sputen met sterke Californische pap (1 deel pap op 9 deelen water) als de bloemtrosjes reeds zichtbaar, doch de bloempjes nog niet geopend zijn. De oudste blaadjes moeten ongeveer zoo groot zijn als een cent. De gevoelige soort Golitath sputen met 1 deel pap op 12 deelen water.

Na de bespuiting treedt soms een lichte bladverbranding op, dit herstelt zich na korten tijd.

**Bladluizen.** Zie bij aalbessen.

### Kruisbessen

**Amerikaansche kruisbessenmeeldauw.** In 't voorjaar witte viltige plekken op de bessen; later worden de plekken bruin.

Jonge scheuten worden later ook met de witte viltlaag bedekt.

Een voorjaarsbespuiting als de bessen ongeveer de grootte van een erwt hebben (ongeveer eerste helft van Mei), met alcalische Bourgondische pap ( $1\frac{1}{2}$  kg kopersulfaat +  $1\frac{1}{2}$  kg sodex op 100 ltr water) houdt de bessen vrij van meeldauw; de bessen (vooral van de onderste driuptakken) moeten goed geraakt worden.

Door de bespuiting met alc. Bourgondische pap worden tevens de tijdens het sputen aanwezige bastaardrupsen gedood. De eerste bespuiting met een maagvergif kan dan vervallen, wat met het oog op den groenen pluk wel van belang is.

**Rode kruisbessenmijt.** De jonge mijten beginnen direct aan de bovenzijde der eerste blaadjes te zuigen, waardoor grauwe vlekjes ontstaan; vaak is het aantal vlekjes zoo groot, dat het heele blad grauw gekleurd wordt en het lijkt of de struiken door loodglans aangetast zijn. Het aangetaste blad blijft klein en valt spoedig af.

Vroeg in het voorjaar, korten tijd voor het uitloopen der struiken, sputen met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum, ook het hart der struiken goed raken.

**Bessenbladwesp.** Zie bij aalbessen.

Voor andere ziekten zie bij aalbessen.

## Framboos

**Ziekte van den stengel.** Aangetaste scheuten sterven af; soms opzwellingen, die later barsten, aan den voet; hierin dikwijls rose zwamkussentjes; dit is echter geen regel. Verschillende zwammen (*Coniothyrium*, *Fusarium*) kunnen oorzaak van deze verschijnselen zijn.

Winterbespuiting met 7½% carbolineum.

Voorjaarsbespuiting met 1½% Bordeauxsche pap, later met 1% herhalen.

**Spruitvreter** (roode worm). Knoppen en jonge scheutjes worden door roode rupsjes, die in een wit coconnetje den winter doorgebracht hebben, uitgevreten.

Winterbehandeling (Febr.) met 7½% carbolineum. De vloeistof moet langs den stengel in den grond afloopen, om de aan den voet der stengels overwinterende rupsjes te doodden.

**Frambozenkever.** Kleine grijze kevertjes beschadigen de nog niet uitgekomen bloemknoppen. De larfjes (de bekende wormpjes) vreten in de vruchten. Eenige keeren, telkens na een week, spuiten met 1 deel nicotine 95–98% in 1000 deelen water, nog beter in 1% zeepsop of met een uitvloeier, of ook met derris-preparaten met een uitvloeier. De bespuitingen moeten 's morgens vroeg uitgevoerd worden; vooral de bloemknoppen goed raken.

Behalve tegen de kevers, kan met succes tegen de larven gespoten worden. Het voordeel daarbij is, dat dan met twee bespuitingen kan worden volstaan, nl. ± 10 Juni en 20 Juni.

## Druif

**Meeldauw.** Bladeren zijn bedekt met een wit bepoederd zwamweefsel (het wit). Zij verdorren en vallen vroegtijdig af. De bessen, welke ook met zwamweefsel bedekt zijn, barsten.

Tegen deze ziekte wordt met zwavel gestoven. Ook worden wel in den winter de stokken met een zwavelpap ingesmeerd. In plaats hiervan kan men ze beter bespuiten met een sterke Californische papoplossing 1 : 9.

**Valsche meeldauw.** Wit schimmelpluis aan de onderzijde der bladeren, meestal op plekjes langs de nerven; bladeren op die plekken roodbruin, verschrompelen spoedig en vallen af. Jonge twijgen en vruchten worden aangetast, bessen worden loodgrijs en leêrachtig.

Zoodra de ziekte zich vertoont, bij ons te lande, voor zoover bekend, uitsluitend buiten en niet in kassen, spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

**Dopluis.** Takken bezet met notedopvormige dopjes, waaronder in Juni de eitjes, welke met een wasdradenmassa omgeven zijn. De witte wasmassa komt later van onder de schilden te voorschijn.

Winterbehandeling met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

**Spint.** De mijten bevinden zich aan de onderzijde der bladeren, welke grijsachtig bruin worden en verschrompelen.

Winterbehandeling  $7\frac{1}{2}\%$  vruchtboomcarbolineum, waaraan een petroleumpreparaat toegevoegd is (in den handel verkrijgbaar) of uitsluitend met een oliepreparaat kan worden aanbevolen, ofschoon deze niet altijd afdoende is. De mijten kunnen behalve op de stokken ook elders (in spleten en kieren in hout- en ijzerwerk van de kassen enz.) overwinteren. Bespuiting der kass wanden is daarom ook gewenscht.

Zomerbehandeling, als bij perzik. Na den bloei kunnen petroleumpreparaten niet meer gebruikt worden.

#### BOOMKWEKERIJGEWASSEN

#### Rozen

**Meeldauw**, „het wit”. Bladeren, scheuten, bloemstelen en knoppen worden met een fijn wit zwamweefsel bedekt, bladeren krullen, verdorren en vallen spoedig af.

Bij het eerste optreden spuiten met Californische pap (1 deel pap op 80 deelen water) of met  $0,1\%$  salicylzuur opgelost in zeep-spiritus (10 g salicylzuur oplossen in  $\frac{1}{10}$  liter spiritus. Dit mengsel voegen bij 10 liter water, waarin 2 ons zeep is opgelost). De oplossing van salicylzuur in spiritus liefst eenigen tijd van te voren klaar maken. Het salicylzuur lost niet zoo spoedig op.

**Valsche meeldauw** ('t „zwart”). Op de bladeren kleine, paarsachtig zwarte vlekken. Het aangetaste blad valt zeer spoedig af.

Zoodra men de vlekken begint waar te nemen, spuiten met  $1\%$  Bordeauxsche pap. Kassen zoo licht en luchtig mogelijk bouwen.

**Sterroetdauw.** Van uit één punt groeit de zwam eenigszins stervormig onder de opperhuid door, waardoor typische stervormige zwarte vlekken ontstaan. Aangetast blad valt vroegtijdig af. Ook jonge takken kunnen aangetast worden.

In het voorjaar, kort na het uitloopen, spuiten met  $1\%$  Bordeauxsche pap.

**Bladluizen.** Door het zuigen der luizen krullen de bladeren. Aangetaste bladeren vallen spoedig af. Op den honingdauw, de



kleverige afscheidingsproducten, welke de bladeren bedekken, ontwikkelt zich een zwarte zwam (roetdauw).

Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum, in kassen 5% gebruiken.

's Zomers spuiten met zeepsoplossing (1 liter spiritus en 2 kg zeep op 100 liter water) of nicotine preparaten.

**Spint.** Mijten aan de onderzijde der bladeren. Eitjes en larvenhuidjes bedekt met glanzend spinsel. Bladeren worden grauw en verschrompelen. Winterbehandeling met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum, waaraan toegevoegd minerale-olie preparaten of 8% van een der minerale-oliepreparaten. In kassen vóór het stoken en na het schoonmaken der struiken 5% carbolineum.

Bij het begin van de aantasting gelukt het wel door flink en krachtig met schoon water te spuiten (vooral de onderzijde der bladeren goed raken) de beschadiging tot staan te brengen.

's Zomers spuiten met 0,4% zwavellever (40 g zwavellever op 10 liter water) en een uitvloeier (zie vlugschr. 36), 1% Californische pap of 1% van een minerale zomerolie.

**Rozenbladwesp.** In de toppen der jonge scheutjes leggen de bladwespen (gele vlieg) de eitjes in rijen; de beschadigde scheut groeit krom. De larven vreten aan de bladeren van den rand af, alleen de hoofdnerven blijven over.

Zoodra vretelij waargenomen wordt, spuiten met 0,3% poedervormig of 0,5% pastavormig loodarsenaat. Om bezoedeling der planten te voorkomen, wordt het loodarsenaat aan een 1% zeepsoplossing in plaats van aan 1% kalkmelk toegevoegd. De larven kunnen ook met contactgiften (zeepsoplossing, nicotinepreparaten) gedood worden.

**Slakvormige bastaardrups.** Eind Mei legt de zwarte bladwesp de eitjes aan rozenbladeren. Larven groenachtig, lichaam van voren breder dan van achteren (dolfijntjes), geen slijmophuizing. Zoodra de larven zich vertoonen spuiten met een contactgif (zeepsoplossing, nicotinepreparaten) of maaggif (0,3% poedervormig of 0,5% pastavormig loodarsenaat).

**Alle vretende insecten.** Zoodra men vretelij begint waar te nemen spuiten met 0,3% poedervormig of 0,5% pasta-vormig loodarsenaat in 1% kalkmelk.

**Rozencicade.** De bladeren worden bezet met witte stipjes, die in zeer groot aantal kunnen optreden, zoodat het bladgroen bijna geheel verdwijnt.

Bestrijding door bespuiting in het begin van den zomer met zeepsoplossing. Vooral de onderzijde der bladeren goed raken.

## Sierheesters

**Bladluizen.** Op tal van sierheesters (jasmijn, sneeuwbal, e.a.) kunnen bladluizen voorkomen.

Door de aantasting vermindert de groei, de bloei gaat soms geheel verloren (sneeuwbal), de bladeren worden soms gekroesd en de jonge scheuten misvormd.

In den zomer kan een bespuiting met zeepspiritus (2 kg zeep + 1 liter spiritus op 100 liter water) of met nicotine 1 : 1000 + uitvloeier resultaat geven.

Een winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum is in vele gevallen nog beter.

Skimmia en Genista verdragen slechts een 5% oplossing.

**Dopluizen.** Verschillende koude kasplanten en ook struiken buiten kunnen sterk door dopluizen aangetast zijn. Door een winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum worden de eitjes of larven gedood. Enkele gewassen (Camellia, Citrus) bespuit men met 5% in plaats van met  $7\frac{1}{2}\%$ .

**Vretende insecten.** Bij de eerste beschadiging spuiten met 0,3% poedervormig of 0,5% pasta-vormig loodarsenaat in 1% kalkmelk.

## Buxus

**Bladvloo.** Door de aantasting zijn de blaadjes bobbelig en naar binnen gebogen, scheutjes zijn gedrongen; de larven overwinteren onder een witte dradenmassa tusschen knopschubben.

Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

**Dop- en Schildluis.** Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

## Rhododendron

**Bladvlekkenziekte** (Gloeosporium rhododendri). Bladeren van verschillende soorten worden aangetast. Ook komen de vlekken vaak voor op zaailingen, die voor zetstammetjes bestemd zijn.

In 't voorjaar spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

**Rhodowants** (Japansche vlieg). In den nazomer legt het wijfje de eitjes in het bladweefsel aan de onderzijde van het blad, meestal langs de hoofdnerf. In Mei verschijnen de larven, die sappen uit het blad zuigen. Het blad krijgt door talloze kleine vlekjes een geelwitte kleur, de onderzijde der bladeren is vuil bruin gekleurd.

Bespuiting met zeepspiritus en nicotinepreparaten geeft goede resultaten (onderzijde der bladeren raken), mits dikwijls gespoten wordt.

**Snuitkever** (*Otiorrhynchus*). Vanaf den bladrand vreet de kever onregelmatige stukken uit het blad. De larven, welke in den grond leven, zijn ook zeer schadelijk, doordat ze aan de wortels vreten.

Zoodra de bladbeschadiging wordt waargenomen, spuiten met 0,3 % poedervormig of 0,5% pasta-vormig loodarsenaat.

### Hortensia

**Meeldauw.** De bladeren worden eerst met wazige witte vlekken bedekt. Later breiden de vlekken zich uit en zien er dan als witbepoederd uit. Een bespuiting met sterke Californische pap (1 : 9) voor het uitloopen kan worden uitgevoerd om de aantasting te voorkomen.

Bij het eerste optreden van de ziekte spuiten met 1% Californische pap.

**Bladvlekkenziekte.** Op de bladeren buine, roodomrande vlekken, vooral bij Truffaut. Zoodra de ziekte begint op te treden, spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

**Spint.** De bladeren worden vaalbruin, verdrogen en vallen spoedig af. Vooral aan de onderzijde talrijke roode spinnende mijten. Krachtig spuiten met water is reeds geschikt om de aantasting te doen afnemen. Beter is echter een bespuiting met 1% van een minerale zomer oliepreparaat. De onderzijde der bladeren moet goed geraakt worden.

### Azalea indica

**Azaleamotje** (*Gracilaria azaleëlla*). De zeer kleine, lichtgroene rupsjes met donkeren kop leven inwendig in de bladeren. Er zijn verschillende generaties per jaar.

Herhaalde bespuitingen met sterke nicotine (1 : 500) of met pyrethrumpreparaten. Ook herhaaldelijk uitgevoerde bespuitingen met 0,3 % poedervormig of 0,5 % pastavormig loodarsenaat geven goed resultaat, wanneer men zorg draagt, de onderkant der blaadjes te raken.

### Azalea (bladverliezende en Japansche)

**Spint** (*Phyllocoptes azaleae*). Bladeren krijgen omgekrulde randen, ontwikkelen zich niet, worden bruin. Scheuten groeien niet uit.

Spuiten in Febr. met 7½% carbolineum.

's Zomers spuiten met 1% Californische pap of met 0,4% zwavellever + uitvloeier. (Zie vlugschr. 36).

**Snuitkever.** Zie bij Rhododendron.



## Wilgen

**Wilgenhaantjes.** Zoowel larven als kevers zijn schadelijk. De eerste skeletteeren het blad, de laatste vreten gaten in het blad en beschadigen den bast van de twijgen. In grienden is de schade zeer aanzienlijk.

Zoodra de kevers worden waargenomen, spuiten met 0,1% Parijsch groen, vooral de onderste takken en daar in 't bijzonder de onderzijde van de bladeren flink raken. Bij wilgen met *behaarde* bladeren echter weinig resultaat. Goed resultaat kan verkregen worden met nicotine (1 deel zuivere nicotine op 1000 deelen 1% zeepwater), met een 5% zeepoplossing en met derrispreparaten.

## Appelzaailingen

(zie ook bij appel)

**Meeldauw.** De groei van appelzaailingen wordt soms sterk belemmerd door de aantasting van meeldauw. Het witte mycelium bedekt de bladeren en overtrekt het lot.

Een bespuiting met Californische pap 1 : 80 geeft goede resultaten.

**Schurft.** Bladeren vertoonen onregelmatige vlekken, die met groenachtig schimmelpuis bedekt zijn. In het voorjaar spuiten met 1% Bordeauxsche pap, daarna eenige keeren met Californische pap 1 : 80.

**Spint.** De blaadjes krijgen een grijze tint. Mijten hoofdzakelijk aan de onderzijde van het blad.

's Winters spuiten met 6-8% van een minerale olie, 's zomers met 1 à 2% van een zomerolie of met een zwavelleveroplossing (zie bij appel).

## Perezaailingen

(zie ook bij peer)

**Bladvlekkenziekte** (*Entomosporium maculatum*). Op de bladeren ontstaan plotseling kleine grijze tot bruine, hoekige vlekjes, die zeer snel in aantal toenemen. Spoedige bladafval.

Dadelijk bij het optreden der vlekjes spuiten met 1½% Bordeauxsche pap en dit om de twee weken herhalen.

## Cytisuszaailingen

**Ceratophorum setosum.** Deze zwam veroorzaakt bruine vlekjes op de bladeren en scheuten van Cytisuszaailingen.

Voorjaarsbespuiting met Bordeauxsche pap  $1\frac{1}{2}\%$ .

## Coniferen

**Dennenschotziekte.** Aanvankelijk gele vlekjes op de naalden, welke later geheel verdrogen en afvallen.

Ziekte komt vooral bij een en tweejarige dennenplanten voor, maar ook oudere boomen zijn niet gevrijwaard.

Tweemaal spuiten met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap, de eerste keer Juni-Juli, tweede keer in September.

**Spint.** Door aantasting door mijten worden de naalden grauw en vallen af. Winterbespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

Alleen enkele Juniperussoorten (Jun. elegantissima) kunnen deze bespuiting niet verdragen. Blauwe sparren verdragen haar zeer goed.

**Luizen.** Op coniferen leven zeer verschillende soorten luizen. Sommige veroorzaken roodachtige gallen aan de takken, anderen doen de knoppen galachtig opzwellen. Ook naalden worden door de luizen beschadigd.

Winterbespuiting (Febr.-Maart) met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

's Zomers kan een bespuiting met zeepschietstof toegepast worden. Blauwsparren zijn gevoelig voor zeepschietstof, de waslaag wordt aangetast.

**Dopluis.** Op verschillende Thuya-soorten komt een dopluis-soort voor. Winterbehandeling met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum geeft uitstekende resultaten.

**Gilletteëlla Cooleyi.** Douglassparren kunnen wit zijn door de zeer groote hoeveelheden, met was bedekte luizen, welke aan de naalden zuigen.

Bestrijding is mogelijk door een bespuiting met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum in den winter; de overwinterende jonge luizen worden dan gedood.

Een voorjaarsbespuiting met nicotine 1 : 1000 + uitvloeier is ook vrijwel afdoende, mits gespoten wordt voordat eitjes zijn gelegd, d.i. voor eind Mei.

## Taxus

**Rondknop.** De door mijten aangetaste knoppen loopen niet uit, doch verdikken zich abnormaal en sterven vrij spoedig af.

Een bespuiting met carbolineum  $7\frac{1}{2}\%$  (Dec.-Jan.) geeft goede resultaten.

**Dopluis.** Kleine schildpadvormige dopjes komen op de takken voor. Gedurende den zomer bevinden zich onder de dopjes een groot aantal eitjes, gehuld in een witte wollige massa, welke van onder de dopjes te voorschijn komt. 's Winters spuiten met  $7\frac{1}{2}\%$  carbolineum.

#### BLOEMGEWASSEN

##### *Viola tricolor* (zaadteelt)

**Bladvlekkenziekte** (Ramularia). Op de bladeren verschijnen vlekken, waardoor de groei der planten geheel ophoudt. Spuiten met 2% Bourgondische pap of 1% Bordeauxsche pap 4 maal, vanaf begin Juli met tussenruimten van 2 weken.

##### Anjelieren

**Roest.** Chocoladekleurige sporenhoopjes op de bladeren, soms ook op de stengels. Bij het allereerste optreden der ziekte bespuiten met 1% Californische pap; de bespuitingen dient men eenige keeren te herhalen.

**Bladvlekkenziekte.** Op de bladeren komen kleine grijze vlekjes voor. Een behandeling met 1% Bordeauxsche pap of met 0,4% zwavelleveroplossing wordt aanbevolen.

**„Het Zwart”** (Heterosporium echinulatum). Op bladeren en stengels ontstaan ronde, witte vlekjes, welke later van het midden uit zwart worden, uitgezonderd de wit blijvende rand. De aantasting kan, vooral in kassen, zeer ernstig zijn.

Een tijdige bespuiting met 1% Bordeauxsche pap verdient aanbeveling.

**Spint.** Bladeren worden grijs. Aan de onderzijde der bladeren bevinden zich de mijten. Bij het eerste optreden spuiten met 0,4% zwavellever vermengd met een uitvloeier, nicotinepreparaten of 1% van een minerale-oliepreparaat. Ook herhaalde bespuitingen met derrispreparaten geven goed resultaat.

##### Hyacinth en Narcis

**Het vuur.** De bladeren krijgen gele toppen, welke in rotting overgaan. Deze rotting zet zich snel naar onderen toe voort.

Spuiten met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap + uitvloeier.



## Tulp

Tulpen verdragen Bordeauxsche pap niet, zoodat dit middel tegen het vuur in dit gewas *niet* aangewend kan worden.

Bevredigende resultaten zijn de laatste jaren verkregen door eenige keeren te spuiten met een 0,8% Shirlan-A.G.-oplossing (8 g per liter water).

## GROENTEN

### Kool

**Valsche meeldauw.** Jonge koolplanten vertoonen geelwitte vlekken op de bladeren. Aan de onderzijde van de vlekken ontstaat een wit schimmelpuis. Bij vochtig warm weer kan de ziekte zich sterk uitbreiden, de planten gaan dan spoedig in rotting over.

Bij het eerste optreden van de ziekte spuiten met 1% Bordeauxsche pap, waaraan een uitvloeier is toegevoegd. Eenige malen licht spuiten. Overigens dient men de kassen of bakken zooveel mogelijk te luchten.

**Aardvlooiën.** Jonge planten worden sterk beschadigd, kleine gaatjes in de bladeren. Van kiemplantjes worden zaadlobben en stengeltop geheel opgevreten. Bij droog, schraal weer kan de schade zeer groot zijn.

Besputtingen met nicotinepreparaten (1 deel zuivere nicotine op 1000 deelen water) + een uitvloeier of met derrispreparaten. Liefst bij zonnig weer tegen de zon in spuiten.

**Draaihartigheid.** Door het zuigen van larfjes van galmugjes in de oksels der bladeren ontstaat een abnormale groei. De bladeren draaien om de lengte-as van den stengel.

Door een wekelijksche of desnoods een tiendaagsche besputting met zeepspiritus of nicotinepreparaten kunnen goede resultaten verkregen worden, ook bij deze besputtingen is toevoeging van een uitvloeier gewenscht.

### Tomaat

**Bladvlekkenziekte** (zgn. meeldauw). Op de bladeren ontstaan geelbruine vlekken, de ziekte begint bij de onderste bladeren, later worden ook de andere aangetast. Aan de onderzijde van de vlekken vormt zich een bruin zwamweefsel. Sterk aangetaste planten sterven vroeg af en geven weinig vruchten.

Vroegtijdig begonnen en herhaalde besputtingen met Californische pap 1 op 80 water (bij zonneschijn 1 op 100) kunnen goede

resultaten geven (ook onderzijde goed raken).

Er zijn ook vrij goede resultaten verkregen door eenige keeren te spuiten met een 0,8% Shirlan A.G. oplossing.

### Komkommer en meloen

**Spint.** Bladeren eerst bedekt met kleine gele vlekken, spoedig wordt het heele blad grauwegeel, dan droogt het blad uit, het wordt hard en stijf, randen krullen om.

De mijten leven aan de onderzijde van de bladeren, daar is het bladoppervlak met een zeer fijn spinsel overtrokken, waartusschen eitjes en larvenhuidjes blijven hangen (meelachtig uiterlijk).

Spuiten met 0,4% zwavelleveroplossing en een uitvloeier (zie vl. 36). Vooral de onderzijde goed raken. Met minerale oliepreparaten (1%) en met derrispreparaten kunnen ook goede resultaten verkregen worden.

### Erwten

**Bladrandkever.** De kevers vreten vanaf den bladrand regelmatige stukjes uit den bladschijf, zoodat het blad een gekartelden rand krijgt. Bij schraal weer kan de schade aanzienlijk zijn.

Jonge planten kunnen bespoten worden met 0,1% Parijsch groen. Zoodra er vruchten (peulen) gevormd zijn, mag met dit vergif niet meer gespoten worden.

**Spint.** Door de aantasting der mijten ontstaan zgn. „spinterige” bladeren. De groei van de planten kan bij droog weer geheel ophouden; het blad verdroogt. Aan bestrijding wordt nog weinig gedaan. Bespuitingen als bij komkommer.

### Boonen

**Bladluizen.** Vooral in „groote boonen” (tuinboonen) kunnen de bladluizen schadelijk zijn. De zwarte luizen zitten bij voorkeur in de toppen. Zij vermeerderen zich sterk, zoodat in korten tijd een groot deel van het gewas aangetast is. De toppen groeien niet meer uit, de schokken groeien krom en bevatten weinig zaden.

Een bespuiting met 2% zeep + 1½% spiritus kan toegepast worden. Ook nicotinepreparaten + uitvloeier geven goede resultaten. Bespuiten, zoodra men luizen ziet.

### Uien

**Valsche meeldauw.** Aan den top van het blad bruingle en witte

vlekken, waarop, vooral bij vochtig weer, een grauwwit, later gevolgd door een zwart, schimmelpuis ontstaat; aangetaste plekken gaan spoedig in rotting over.

Bij zaadplanten wordt de bloemstengel aangetast, die daar op de rotte plek omknikt.

Bij het eerste optreden van de ziekte onmiddellijk spuiten met 1 à 2% Bordeauxsche pap waaraan een uitvloeier moet worden toegevoegd. Eenige keeren kort na elkaar zeer licht spuiten, daar anders nog de vloeistof van de gladde bladeren afstroomt.

#### LANDBOUWGEWASSEN

### Aardappel

**De aardappelziekte.** Bladeren krijgen bruinigrijze vlekken, welke zich bij vochtig, warm weer snel uitbreiden, in enkele dagen kunnen de planten geheel afgestorven zijn.

Bespuiten met  $1\frac{1}{2}\%$  à  $2\%$  Bordeauxsche pap of met  $\pm 2\frac{1}{2}\%$  Bourgondische pap. De eerste maal kort voor of bij het uitbreken der ziekte, daarna nog eenige keeren al naar de omstandigheden dit noodig maken. Door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt wordt per radio bekend gemaakt, wanneer de factoren voor het optreden of voor uitbreiding van de ziekte gunstig zijn.

Het is noodig meermalen te spuiten en dit tot kort voor het rooien vol te houden, daar anders de kans bestaat, dat de knollen meer aangetast worden dan zonder bespuiting.

### Beten

**Valsche meeldauw** (langzaam verlopend hartrot). Vooral de hartbladeren worden aangetast, deze bladeren vertoonen bleek-groene, eenigszins gewelfde plekken, aan de onderzijde daarvan grauw schimmelpuis, bladeren rotten weg, later ook de top van de biet.

Ook zaadstengels kunnen aangetast worden, dan lijdt de zaadvorming daar sterk onder.

Bij het eerste optreden spuiten met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap, waaraan een uitvloeier is toegevoegd.

**Aaskever.** Jonge bietenplantjes worden soms geheel afgevreten door de vrij platte, grauw gekleurde larven van aaskevers.

Een onmiddellijke bespuiting met 0,1% Parijsch groen geeft baat.

**Schildpadtorretje.** Betrekkelijk kleine, langwerpige, geelgroene larven vreten groote gedeelten van het blad op. In sommige jaren

is de schade bijzonder groot. De kevertjes zijn bruin, vrij plat; de dekschilden steken met een platte rand buiten het lichaam uit.

Bij de eerste beschadiging, die soms al bij de kiemplanten — en dan ernstig — optreedt, onmiddellijk spuiten met 0,1% Parijsch groen (meldeplanten zooveel mogelijk verwijderen).

### Koolzaad

**Glanskever.** Glimmend groenzwarte kevers en geelachtig witte larven vreten aan en in de bloemen van kruisbloemige gewassen. Eenige bespuitingen met een maagvergif of met nicotine 1:1000 in 1% zeepwater of uitvloeier. 's Morgens vroeg spuiten, eerste bespuiting bij het opengaan der eerste bloemen. Met het oog op bijenvergiftiging mag tijdens den bloei niet met een maagvergif gespoten worden.

**Aardvlooiën.** Kevers beschadigen de bladeren en onrijpe hawen, larven maken gangen in bladstelen en zaadstengels. In het voorjaar eenige keeren spuiten met nicotine 1 : 1000 in 1% zeepwater of met derrispreparaten.

### Erwten

**Bladrandkever.** Zie bij groenten blz. 20.

### Vlas

**Aardvlooiën.** Vooral de overwinterde kevers beschadigen in een droog, schraal voorjaar de jonge vlasplanten sterk. Zoodra beschadiging optreedt spuiten met nicotine 1 : 1000 in 1% zeepwater of met een derrispreparaat. Bespuiting één of tweemaal.

### Karwij

**Karwijmot.** De vlinders, welke overwinteren, vliegen in het vroege voorjaar op windstille avonden na warme dagen. Zij leggen dan eitjes op de bladstelen, na  $\pm$  4 weken komen daaruit de rupsjes, zij begeven zich al vretende naar de bloemschermen, welke ingesponnen worden. Binnen het spinsel heeft de vreterij aan de bloemknoppen plaats.

Voordat de rupsjes het bloemscherm te samen spinnen kan gespoten worden met 1 à 2% kiezelfluorbarium. Bestuivingen met derrispoeder zijn echter beter werkzaam en praktisch beter uitvoerbaar.



## Onkruidbestrijding in granen

**Herik.** Dit onkruid kan in zulke groote hoeveelheden op de akkers voorkomen, dat het gewas er door verstikt wordt; tevens kunnen op dit onkruid tal van ziekten voorkomen, welke later het geteelde gewas besmetten. Vernietigen van dit onkruid is dus zeer gewenscht. Dit kan verkregen worden door bespuiting met een oplossing van 20% ijzervitriool en 2% zwavelzuur. Voor deze bespuiting wordt van de paardensproeimachine gebruik gemaakt. Ook oplossingen van zwavelzure ammoniak hebben bij proeven goede resultaten gegeven.<sup>1)</sup>

## II. SPROEIMIDDELEN

In verband met hun werking onderscheiden we drie groepen van middelen:

- 1°. die, welke dienen ter bestrijding van dierlijke parasieten (insecticiden).
- 2°. die, welke gebruikt worden tegen ziekten, veroorzaakt door zwammen (fungiciden).
- 3°. die, welke niet zelf bestrijdingsmiddel zijn, maar, door toevoeging aan de sproeivloeistof, de gunstige werking der bestrijdingsmiddelen zeer kunnen verhoogen (uitvloeiers).

De groep van insecticiden verdeelt men naar de wijze waarop zij de dierlijke parasieten dooden, in drie ondergroepen:

- a. Contactgiften, die de diertjes of de eieren dooden, als zij er mee in aanraking komen (carbolineum, derris, spiritus);
- b. Maagvergiften, waardoor de diertjes gedood worden, als zij ze met het voedsel in de maag opnemen (arsenicumpreparaten);
- c. Ademhalings- en zenuwvergiften. Deze dringen in de ademhalingsbuizen of prikkelen de zenuwen zóó, dat de dood van de diertjes er het gevolg van is (nicotine).

De fungiciden hebben meestal een voorbehoedende werking.

De echte zwammen, welke voor plantenziekten de meeste beteekenis hebben, bezitten een uitgebreid netwerk van fijne draden (mycelium). Dit mycelium leeft inwendig in de planten; alleen bij de meeldauwzwammen leeft het uitwendig op de planten.

---

<sup>1)</sup> Overigens kan men ook zonder spuiten, door bestrooïing met fijn-gemalen kainiet, de herik afdoende bestrijden. Deze mededeeling bespreekt echter alleen sproei-middelen.

De zwammen planten zich voort door sporen, uiterst fijne organen, die, wanneer ze op een plant terecht komen, onder gunstige omstandigheden gaan kiemen en daarbij een kiembuis vormen, die in het plantenweefsel binnendringt, waarin of waarop zij zich verder tot mycelium ontwikkelt.

De meeste fungiciden hebben ten doel de kiemen der sporen te doden (koperverbindingen).

Bij de meeldauwzwammen, „wit” op perzik, appel en roos, Amerikaansche kruisbessenmeeldauw e.a., leeft het mycelium buiten op de plantendeelen, (bladeren, scheuten, vruchten). Dit uitwendige mycelium kan gedood en verdere ontwikkeling tegengegaan worden, (zwavelpreparaten, Bordeauxsche pap).

Door te spuiten met mengsels van fungiciden en insecticiden — verschillende mengsels zijn in den handel verkrijgbaar, ook kunnen zij zelf gemaakt worden — kan men tegelijkertijd zwamziekten en dierlijke parasieten bestrijden.

Tot de derde groep van middelen behooren de zgn. uitvloeiers. Het zijn stoffen, welke als vloeistof met de sproeivloeistoffen gemengd of als poeder er in opgelost kunnen worden.

Door toevoeging van een uitvloeier wordt de oppervlakte-spanning der sproeivloeistoffen belangrijk verlaagd, het gevolg daarvan is, dat de verspoten vloeistof zich minder sterk tot druppels samentrekt, m.a.w. beter uitvloeit en daardoor gladde plantendeelen beter bevochtigt.

De bestrijdingsmiddelen worden nu gelijkmatig over bladeren en vruchten verdeeld, de resultaten van de bespuitingen worden daardoor zekerder. Vrij zeker kan met minder vloeistof volstaan worden; ervaren spuiters kunnen dit bereiken. Niet onmogelijk is het, dat ook slappere oplossingen gebruikt zullen kunnen worden.

## INSECTICIDEN

### Contactgiften

Het belangrijkste middel uit deze groep is carbolineum, waarvan in den loop der jaren het gebruik zeer sterk is toegenomen.

**Carbolineum** wordt bereid uit teer, die als bijproduct bij de gasfabricatie gewonnen wordt.

Uit de teer worden sommige bestanddeelen verwijderd; door destillatie wordt zij dan verder in fracties gescheiden, elke volgende fractie bevat teeroliën met een hooger kookpunt. Van de verschillende teeroliën kunnen mengsels gemaakt worden — de ervaring heeft geleerd, dat mengsels met veel hoog kokende oliën

het werkzaamst zijn — en deze mengsels worden emulgeerbaar, d.i. vermengbaar met water, gemaakt.

De carbolineum moet zich uiterst fijn in water verdeelen; dit is het geval als de zgn. oplossing (emulsie) een melkwitte of licht-chocoladekleurige vloeistof vormt, waarin geen of hoogstens enkele bruine druppels mogen voorkomen. Is er een duidelijke afscheiding van teeroliën, dan is de emulsie niet goed en mag de vloeistof niet verspoten worden.

Er mag zich, als de verdunde vloeistof eenigen tijd blijft staan, ook geen bezinksel afzetten.

Als geen goede emulsie verkregen wordt, kan de fout in de carbolineum zelf schuilen. Waar de bereiding der vertrouwde merken echter op een jarenlange ervaring berust en de fabrikanten, die hun producten onder toezicht van den Plantenziektenkundigen Dienst hebben gesteld, er naar streven een goed product te maken, behoeft men voor ondeugdelijke carbolineum niet ernstig bevreemd te zijn.

Onbruikbare oplossingen kunnen ontstaan met brak en met hard water. In verschillende streken van ons land kan het sloot- en welwater een te hoog zoutgehalte hebben; voor de meeste carbolineumsoorten is een gehalte van 3 g keukenzout per liter water reeds te hoog, enkele soorten geven echter met water, dat 6 g keukenzout per liter bevat, nog goede emulsies.

De bezwaren van brak water zijn niet te ondervangen, hard water kan door toevoeging van een 10% soda-oplossing geschikt gemaakt worden.

Carbolineum is gevoelig voor lage temperaturen. Wanneer de carbolineum b.v. bij strenge vorst in de boomgaarden heeft gelegen, kan er een verandering in hebben plaats gegrepen; er kan een scheiding zijn ontstaan tussehen dun vloeibare en dikke slijmerige oliën.

Soms gelukt het door langzame verwarming en flink schudden (rollen der vaten) weer een homogeen mengsel te maken, dat een goede emulsie geeft, maar niet altijd is dit het geval. Men zij dus met carbolineum, welke aan vorst is blootgesteld geweest, voorzichtig.

Ontmenging kan verder een gevolg zijn van een verkeerde wijze van oplossen. Men mag carbolineum niet eerst met een kleine hoeveelheid water omroeren en er later de rest van het water bijvoegen. Er bestaat dan kans, dat de carbolineum uitslaat, d.w.z., dat de teeroliën vrij komen; deze oliën kan men niet weer opgelost krijgen. De carbolineum moet daarom bij de benodigde hoeveelheid water gegoten worden.

Vroeger gebeurde het wel, dat zich uit carbolineum vooral

tijdens een vorstperiode, een zandachtige massa (naphthaline) afgezet had. Tegenwoordig wordt de naphthaline uit de carbolineum verwijderd, een „zandig” bezinksel mag nu niet meer voorkomen.

Carbolineum is uitsluitend een winterbespuitingsmiddel, men gebruikt vrijwel algemeen een  $7\frac{1}{2}\%$  oplossing. Perziken verdragen niet meer dan 5% en ook pruimen, vooral krozen, welke eenigszins gevoelig zijn, bespuite men na Januari met 6%.

Door de carbolineumbespuiting worden dierlijke parasieten (ook de eieren), welke overwinteren, gedood. Carbolineum is daardoor een goed middel tegen bladluizen, schild- en dopluizen, spruitvreter van bessen en frambozen, wintervlinder, blad-vlooien en in meer of mindere mate tegen spint, bloedluis en wantsen.

Tegen wantsen doet men beter een speciaal soort, de zgn. wantsen carbolineum te gebruiken, terwijl tegen spint en bloedluis de minerale oliën krachtiger werkzaam zijn.

De werking tegen spint kan verhoogd worden, door aan het carbolineum een minerale olie-preparaat toe te voegen. Dergelijke mengsels zijn in den handel verkrijgbaar.

Ofschoon carbolineum een insecticide is, geeft het in sommige gevallen ook baat tegen zwamziekten als *Monilia* van de pruim, kanker bij appels en peren, meeldauw bij kruisbessen en de bladvalziekte bij bessen.

Carbolineum doodt verder den groenen aanslag, (bestaande uit mossen, wieren en korstmossen), welke vaak op stammen en takken te vinden is. Het gevolg van de bespuiting is dan ook, dat de stammen mooi glad en glanzend worden. In vele gevallen bevordert carbolineum den groei van de gewassen.

Er zijn aanwijzingen, dat een vroege bespuiting de eerste ontwikkeling vervroegt, een late bespuiting deze vertraagt. Men meent van deze vertragende werking te kunnen gebruik maken om gevoelige gewassen (krozen, zwarte bessen) tegen nachtvorst te beschermen. Door deze gewassen laat te bespuiten zou de bloei pas plaats vinden in een periode, waarin van nachtvorsten niet veel meer te vreezen is.

Carbolineum kan ook dienst doen bij het schoonmaken (ontsmetten) van kassen en bakken. Eenige voorzichtigheid moet daarbij in acht genomen worden; tomaten, komkommers, meloenen en rozen zijn zeer gevoelig gebleken, zoodat ze in kassen, welke met carbolineum schoongemaakt waren, ook vrij langen tijd na de behandeling niet meer wilden groeien of een uiterst kwijnend bestaan hadden. Andere gewassen zijn minder gevoelig; toch moet het schoonmaken een behoorlijken tijd voordat geplant



wordt of voordat men de ramen gaat gebruiken, plaats hebben.

**Minerale oliepreparaten.** Zooals carbolineum een mengsel is van lager en hooger kokende teeroliën, zoo zijn de minerale oliepreparaten mengsels van lager en hooger kokende minerale oliën. Sommige soorten bevatten tamelijk veel petroleum, andere meer de hooger kokende smeerolie. De voor bestrijdingsdoeleinden bestemde oliën moeten zeer gezuiverd en dan vermengbaar met water gemaakt worden.

Men onderscheidt winteroliën, die uitsluitend gedurende de rustperiode der boomen en zomeroliën, welke 's zomers verspoten worden.

De winteroliën kunnen uitstekend naast carbolineum gebruikt worden. Zij kunnen zelfs als een aanvulling van dit middel beschouwd worden, omdat zij juist bijzonder werkzaam zijn tegen die parasieten (spint, bloedluis, wantsen) waartegen carbolineum onvoldoende werkt.

Ofschoon de winteroliën nog betrekkelijk weinig gebruikt zijn, kan nu wel reeds aanbevolen worden in Januari of Februari eerst met carbolineum (6%) te spuiten en later met een oliepreparaat.

Men dient daarmede dan zoo laat mogelijk te spuiten, maar toch nog voordat de knoppen beginnen uit te loopen; pruimen zullen wat vroeger (Februari), appels later (Maart) bespoten moeten worden.

Voor pruimen neme men niet meer dan 8-6%, appels bespuitte men met 10-8%, met een slappere oplossing naarmate er later gespoten wordt.

Men kan *niet*, zooals bij carbolineum, de minerale olie bij het water gieten, maar moet eerst met een weinig water de dikke olie-brij tot een dunnere, vloeibare, homogene massa roeren en dan kan men de dunnere pap bij het water gieten.

De zomeroliën zullen in de fruitteelt hier te lande geen groote rol gaan spelen. Het is niet mogelijk korten tijd na elkander oliepreparaten en Californische pap te verspuiten; komen beide middelen op bladeren en vruchten samen, dan bestaat er groote kans op bladverbranding en vruchtval. Daar Californische pap een middel is, dat wij bij de schurftbestrijding niet kunnen missen, moet van het gebruik van zomeroliën in de fruitteelt worden afgezien.

Voor de bestrijding van spint op gewassen, die niet met Californische pap bespoten zullen worden, kunnen de zomeroliën uitstekend dienst doen. Men gebruike dan 1 à 2% oplossingen.

**Zesopea.** Dit middel kan men zelf bereiden met Zeep, Soda en Petroleum. Om de sproeivloeistof te maken, roert men 2 ons zachte zeep met 1 ons fijne soda goed dooreen, tot een homogene

massa ontstaat; daaraan voegt men, onder voortdurend roeren, druppelsgewijs 100 cm<sup>3</sup> petroleum toe. De zalvige massa, die men dan verkrijgt, wordt, ook onder roeren, bij 10 liter water gevoegd. De pasta kan niet bewaard worden. Toen de fabriekmatig bereide minerale-oliepreparaten nog weinig bekend waren, is Zesopea in verschillende gevallen met succes gebruikt. Nu doet men verstandig de betere, in den handel verkrijgbare, preparaten te gebruiken.

**Zwavellever.** Ruwe zwavellever (zwavelkalium) is voor bespuitingsdoeleinden geschikt. Men lost de brokken op in water. Voor 100 liter water is 4 ons zwavellever noodig, men spuit dus met 0,4% oplossing. De oplossing kan niet bewaard worden.

Het middel is zeer werkzaam tegen spint, terwijl ook andere zachthuidige insecten er mee bestreden kunnen worden.

Toevoeging van een goeden uitvloeier, die het doordringen van de vloeistof in allerlei schuilplaatsen en het bevochtigen der insecten bevordert, verhoogt de werking van het middel.

**Californische pap.** Dit middel, dat vooral als fungicide gebruikt wordt, heeft ook een insecticide werking. Het wordt gebruikt in een verdunning met water van 1 : 9 tegen de pokziekte bij peren en tegen rondknop op zwarte bessen en in een verdunning met water van 1 : 80 tegen spint.

**Zeepspiritus.** Dit is een zeer bruikbaar middel tegen diertjes met een weeke, zachte huid, zooals bladluizen. Door aanraking met deze vloeistof worden de meeste van deze insecten gedood. Het is echter vaak moeilijk hen te raken, als ze verscholen zitten in de sterk gekrulde bladeren.

Jonge schildluizen, die als kleine witte stipjes in het voorjaar op aangetaste boomen zichtbaar zijn, kunnen ook door een zeepspiritusbespuiting gedood worden.

Bloedluis is zoo goed beschermd door de wasachtige massa, dat ze door een bespuiting niet gemakkelijk gedood wordt.

Aanstippen met een harde borstel of kwast geeft dan ook beter resultaat. Meestal wordt daarvoor een sterkere oplossing, soms zelfs onverdunde spiritus, gebruikt dan tegen bladluizen.

De zeepspiritusoplossing wordt gemaakt door 1 liter brandspiritus toe te voegen aan 100 liter water, waarin 2 kg zachte zeep is opgelost.

**Derrispreparaten.** In de tropen groeien planten (*Derris elliptica* = akar toeba), welke in de wortels een stof bevatten (rotenon), die alleen voor koudbloedige dieren, o.a. insecten, visschen e.a. giftig is, doch voor warmbloedige, (mensch en huisdieren) onschadelijk is. Er komt voor deze preparaten, mede door de bemoeiingen van het Koloniaal Instituut, meer belangstelling.

Er bestaan extracten van derriswortels, die direct met water

mengbaar zijn. De hoeveelheid, welke van deze stoffen per 100 liter water noodig is, hangt o.a. van het rotenongehalte af. Men volg de bijbehorende voorschriften.

Ook wordt wel een poeder van zeer fijn gemalen wortels, met water vermengd, verspoten. De hoeveelheid poeder, welke per 100 liter water noodig is, houdt eveneens verband met het rotenongehalte.

**Phytophiline.** Een geheimmiddel, waarvan de samenstelling niet met zekerheid bekend is. Het kan met goed gevolg gebruikt worden, waar nicotinepreparaten ook baat kunnen geven. De prijs is vrij hoog.

**X.L.All.** Dit Engelsche preparaat, ofschoon vrij duur, wordt op verschillende kweekerijen wel gebruikt om bladluizen, spint, thrips e.a. te doodden. Het is als vloeistof en als pasta in den handel.

**Andere middelen.** Er zijn verschillende Duitsche preparaten in den handel gekomen, o.a. Limitol en Ustin tegen bloedluis, Exodin, Venetan, Aphidon en andere tegen bladluizen. Zij zijn wel werkzaam, doch duur en worden daarom alleen in bijzondere gevallen gebruikt.

### Maagvergiften

Hiervoor gebruikt men hoofdzakelijk arsenicumverbindingen. Zij kunnen slechts gebruikt worden tegen vretende insecten als ook tegen thrips. Insecten met enkel zuigende monddeelen, zooals bladluizen, worden er niet door gedood.

De arsenicumpreparaten gebruikt men in 1% kalkmelk (10 g drooggebluschte kalk per liter water). Zonder bijvoeging van kalk bestaat er kans op bladverbranding, welke door vrij arsenigzuur veroorzaakt wordt. Arsenicumpreparaten mogen niet meer verspoten worden op plantendeelen, die binnen een maand na de behandeling genuttigd worden. Men lette ook op onderculturen.

Als men bij het afwegen van kleine hoeveelheden niet over kleine gewichten beschikt, kan men van geldstukken gebruik maken. Mits niet te veel afgesleten weegt een rijksdaalder 25 g, een gulden 10 g, een kwartje  $2\frac{1}{2}$  g en een dubbeltje 1 g.

**Parijsch groen.** Dit is een bekende groene verfstof, welke bij drogisten verkrijgbaar is. Tegenwoordig gebruikt men dit middel voor het bespuiten van vruchtboomen haast niet meer, het is vrijwel geheel door loodarsenaat verdrongen. Eén der redenen hiervoor is, dat loodarsenaat wel, maar Parijsch groen niet met Californische pap vermengd kan worden. Een tweede reden is de omstandigheid, dat Parijsch groen gemakkelijker bladbeschadiging ver-

oorzaakt dan loodarsenaat. Arsenicumpreparaten worden, om bladverbranding te voorkomen, vermengd met water, waaraan 1% kalk is toegevoegd, doch ook in deze kalkmelk levert Parijsch groen nog gevaar op voor bladverbranding. Wenscht men toch Parijsch groen te gebruiken, dan is 1 g per liter kalkmelk voldoende. Deze geringe hoeveelheid is reeds voldoende om alle vretende insecten te doden. Er behoeft zelfs niet zwaar gespoten te worden.

Parijsch groen lost niet op, maar blijft eenigszins zweven. Af en toe flink schudden is noodig om het op den bodem zinken tegen te gaan.

**Uraniagroen.** Dit is vrijwel hetzelfde als Parijsch groen. Het wordt echter uitsluitend voor bestrijdingsdoeleinden in den handel gebracht. In verband met deze bestemming is het lichter en fijner, zoodat het in de vloeistof minder snel naar den bodem zinkt. Men gebruikt er ook 1 g per liter vloeistof van. Ook dit middel kan niet met Californische pap vermengd worden.

**Uraniagroen tabletten.** Aangezien het afwegen van het poeder-vormige Parijsch groen, vooral omdat de benodigde hoeveelheden zoo klein zijn, eenigszins bezwaarlijk is, heeft men het Uraniagroen in tabletvorm vervaardigd.

Elke tablet, voldoende voor 100 liter water, is in vijf reepen verdeeld, zoodat ook gemakkelijk de hoeveelheid voor kleinere hoeveelheden (20 liter, 10 liter) afgemeten kan worden.

Doordat reeds een stof is toegevoegd, die het vrije arsenigzuur onschadelijk maakt, behoeft men ook geen kalk meer te gebruiken, doch kan men het blokje direct met wat water aanroeren tot een papje, dat dan met de rest van het water wordt vermengd.

Perziken blijken echter gevoeliger te zijn dan andere gewassen.

Voor dit gewas is toevoeging van kalkmelk raadzaam, daar anders nog verbranding optreedt. Beter nog is het perziken niet met bovenstaande middelen, doch met loodarsenaat te bespuiten.

Parijsch- en Uraniagroen kunnen wel met Bordeauxsche pap niet met Californische pap of met Bourgondische pap vermengd worden.

**Loodarsenaat.** Bij het gebruik van loodarsenaat is de kans op bladverbranding geringer dan bij gebruik van Parijsch groen. Bij sommige pruimsoorten (kwetsen, Eldensche Blauwe), die blijkbaar zeer gevoelig zijn, kan loodarsenaat ook beschadiging veroorzaken.

Van deze stof, die als poeder en als pasta verhandeld wordt, gebruikt men 3 g poeder of 5 g pasta per liter kalkmelk.

Loodarsenaat kan vermengd worden met Bordeauxsche en met Californische pap, niet met Bourgondische pap.



**Kiezelfluorbarium**, een wit poeder, dat niet oplost in water, doch evenals loodarsenaat blijft zweven.

Het is minder giftig dan loodarsenaat en wordt daarom wel ter vervanging van de arsenicumverbinding aanbevolen.

Gebruikt wordt 1 à 2 g per liter water of beter nog per liter 1% kalkmelk.

**Bariumchloride**. Dit witte poeder is veel minder giftig dan de vorige middelen. Men gebruikt het alleen als een bespuiting met arsenicumpreparaten niet toegepast kan worden en een bespuiting toch noodzakelijk is. Dit geval kan zich o.a. voordoen tijdens den bloei van de bessestruiken, wanneer deze worden beschadigd door de bessenbastardrupsen. Spuit men dan met arsenicumpreparaten, dan kan men groote schade aan de bijenvolken toebrengen.

Het bezwaar van bariumchloride is, dat het gemakkelijk afgespoeld wordt door regen. Men gebruikt het middel evenwel op het moment, dat het blad aangevreten wordt, zoodat het vrijwel direct kan werken. Mocht spoedig na de bespuiting regen volgen en blijkt dan na eenige dagen, dat de vretelij niet tot staan is gekomen, dan zal men de bespuiting moeten herhalen. Men gebruike 1½ g bariumchloride per liter kalkmelk.

**Kalkmelk**. Speciaal ter bestrijding van thrips worden planten wel bespoten met 2% kalkmelk. Er komt op de planten dan een laagje kalk, dat ze beschermt tegen de beschadigingen, welke thrips teweeg brengt. Overigens wordt een 1% kalkmelkoplossing gebruikt voor vermenging met arsenicumpreparaten.

### Ademhalings- en zenuwvergiften

**Nicotinepreparaten**. Het eenvoudigste is een aftreksel van goedkope tabak of tabaksstelen. Men neemt van 3 tot 5 pond per 50 liter water; eerst de tabak op 10 liter water 24 uur op een warme plaats laten trekken.

Met meer zekerheid kan men gebruik maken van de preparaten, welke door verschillende fabrikanten in den handel gebracht worden. De verschillende preparaten hebben niet alle hetzelfde nicotine-gehalte. Daardoor moet men van het eene product een sterkere oplossing gebruiken dan van het andere. De sproei-vloeistof moet op 1000 à 1500 deelen water 1 deel zuivere nicotine bevatten. Het best voldoen de hoogprocentige (95-98%) nicotinepreparaten. Hiervan heeft men per liter water 1 g = ± 1 cm<sup>3</sup> noodig.

De gebruiksaanwijzing, welke op de verpakking staat aangegeven, kan gevolgd worden.

Met nicotinepreparaten doodt men bladluizen, spint, thrips, frambozenkevers, aardvlooien, e.a. Vrij gevoelige kasplanten kunnen er nog mee behandeld worden, alleen bij *Adiantums* moet men voorzichtig zijn.

Nicotine kan toegevoegd worden aan Bordeauxsche pap, Californische pap, zeepspectrum en maagvergiften.

Verdere middelen, tot deze rubriek behoorend, zijn verschillende petroleum bevattende middelen, b.v. Rids (Radicaal Insecten Doodende Straal), Abis (Afdoende Bestrijding Insecten Schade), Alio Spree, Flyosan, Flit, Shell Tox en meer dergelijke middelen. Zij werken zeer goed tegen vliegen, muggen, motten in kamers, kelders en stallen. Voor insectenbestrijding op planten zijn zij minder geschikt.

#### FUNGICIDEN

**Bordeauxsche pap.** Dit meest bekende en meest gebruikte bestrijdingsmiddel is bij toeval gevonden. Oorspronkelijk werd het in Frankrijk op druiven verspoten om diefstal tegen te gaan. De blauwe kleur der bespoten planten gaf den indruk, dat deze vergiftig waren. In 1882, toen de valsche meeldauw bijzonder hevig optrad, bleek, dat de bespoten druiven gezond bleven, terwijl de onbehandelde in korten tijd het blad lieten vallen. Daarna heeft men nauwkeurig den invloed van Bordeauxsche pap nagegaan en gevonden, dat deze pap tegen verschillende zwamziekten een uitstekend middel was.

Bordeauxsche pap wordt gemaakt uit kopervitriool en kalk. Tegenwoordig gebruikt men meestal een  $1\frac{1}{2}\%$  of een  $1\%$  oplossing, daarvoor is resp. noodig  $1\frac{1}{2}$  kg kopervitriool + 1 kg kalk en 1 kg kopervitriool + 0,7 kg kalk op 100 liter water.

Als men geen kluutkalk of droog gebluschte kalk (poederkalk) ter beschikking heeft, kan men ook kalkbrij, zooals metselaars en stucadoors gebruiken, met water tot kalkmelk aanmengen.

Volgens het oude voorschrift moest men de kalk met 50 liter water tot kalkmelk omroeren en daaraan 50 liter kopersulfaat toevoegen. Men kan de pap eenvoudiger maken door de kalk met 90 liter water om te roeren en dan 10 liter kopersulfaatoplossing bij de kalkmelk te gieten. In deze 10 liter kopersulfaatoplossing moet zich natuurlijk evenveel kopersulfaat ( $1\frac{1}{2}$  kg) bevinden als vroeger in 50 liter. Voor het maken van de geconcentreerde oplossing gebruike men liefst warm water en de zeer fijn gekristalliseerde kopervitriool.

De oplossing moet klaar gemaakt worden in houten vaten, daar ijzer door kopervitriool aangetast wordt.

Bij motorsproeimachines vult men het reservoir wel eerst gedeeltelijk met kalkmelk, daarna spoelt men de benodigde hoeveelheid kopersulfaat met de rest van het water door de zeef. Er ontstaan dan licht-blauw gekleurde geleachtige verbindingen, die in de vloeistof blijven zweven. Ofschoon deze bereidingswijze zeer practisch is, heeft zij toch bezwaren; er kunnen kopervitrioolkristallen door de zeef vallen; in de kalkmelk lossen deze kristallen niet geheel op. De niet opgeloste kopervitrioolkristallen kunnen later verbranding veroorzaken. Beter is het daarom eerst het kopervitriool op te lossen en de oplossing bij de kalkmelk te gieten.

Bordeauxsche pap werkt voorbehoedend. Het doodt de jonge kiemdraad op het oogenblik, dat deze uit een zwamspore groeit en in het blad zal binnendringen. Men veronderstelt, dat de kiemdraad een eenigszins zuur vocht afscheidt, waardoor de koper-verbindingen opgelost worden en dan de jonge kiem dooden.

Het gebruik van veel kalk, waartoe sommige kweekers wel neiging hebben, omdat zij meenen, dat de kleefkracht daardoor verhoogd wordt en omdat zij dan het spuitwerk beter kunnen controleeren, moet toch ontraden worden. De overmaat van kalk kan de Bordeauxsche pap minder werkzaam maken. Er wordt wel beweerd, dat een overmaat van kalk de schadelijke nevenwerking van Bordeauxsche pap (ruwe schil bij peren) zou verminderen. Proefnemingen hebben dit vermoeden niet bevestigd.

In Bordeauxsche pap hebben we een uitstekend middel tegen de schurftziekte van appel en peer. De eerste bespuiting met  $1\frac{1}{2}\%$  moet plaats hebben als de bloemknoppen zich beginnen te vertoonen. De gemengde- en bladknoppen zijn dan reeds los. Goudreinetten en andere zeer gevoelige soorten moeten enkele weken vroeger bespoten worden.

Peren kunnen voor de tweede maal bespoten worden met  $1\%$  als de vruchtjes gezet zijn en zoo noodig een derde maal eenige weken daarna.

Appels verdragen een bespuiting met Bordeauxsche pap op de bladeren en vruchten niet goed. Voor de tweede en derde bespuiting gebruikt men daarom Californische pap (1 op 80 à 150). Ook voor de tweede en derde bespuiting bij peren begint het gebruik van Californische pap toe te nemen. Bij het gebruik van dit middel kleuren de vruchten zich mooier. Bordeauxsche pap maakt soms de schil eenigszins ruw.

Bordeauxsche pap ( $1\%$ ) wordt verder met succes gebruikt tegen valschen meeldauw bij kool, uien, druif, rozen (het zwart), bladvalziekte bij bessen e.a. Daar het vooral bij kool en uien uiterst moeilijk is de vloeistof op de bladeren te doen hechten, is

het noodig zeer licht te spuiten, met den sproeidop ver van de planten verwijderd. Zoodra de fijne druppeltjes opgedroogd zijn, spuit men voor de tweede maal, weer zeer licht. Door dit eenige malen te herhalen, kan men een voldoende hoeveelheid pap op de planten brengen. Toevoeging van een uitvloeier is noodzakelijk.

Er zijn verschillende vervangmiddelen voor Bordeauxsche pap in den handel gekomen. Zij zijn eenvoudig in het gebruik, men behoeft het poeder slechts eerst met een weinig water tot een papje om te roeren en dan deze pap in de benoodigde hoeveelheid water te gieten en de sproeivloeistof is gereed. Hoewel velen over deze vervangmiddelen wel tevreden zijn, meenen anderen minder goede resultaten bereikt te hebben en achten zij de kans op beschadiging grooter. De gewone Bordeauxsche pap verdient volgens hen de voorkeur.

Tegen de aardappelziekte zou ook Bordeauxsche pap gebruikt kunnen worden, men gebruikt echter voor dat doel uitsluitend

**Bourgondische pap.** Hierin is de kalk vervangen door sodex (watervrije soda). Het mengsel van kopervitriool en sodex, het zgn. normaal pappoeder, bevat deze stoffen in de verhouding van 2 op 1 en is direct voor het gebruik gereed. Om pap te maken, die overeenkomt met  $1\frac{1}{2}\%$  Bordeauxsche pap heeft men  $2\frac{1}{4}$  kg normaal pappoeder op 100 ltr water noodig. In het gebruik is normaal pappoeder dus eenvoudiger dan Bordeauxsche pap. De prijs is eenigszins hooger. Op ooftboomen gebruikt men geen Bourgondische pap wegens het gevaar voor bladbeschadiging.

In het droge mengsel kunnen bij langdurige en niet volkomen droge bewaring omzettingen plaats hebben. Het kopervitriool, dat in zuiveren toestand als helder blauwe kristallen tusschen de sodex voorkomt, heeft dan een groene kleur aangenomen. Groenachtig normaal pappoeder is niet voor het gebruik geschikt.

**Alcalische Bourgondische pap.** Het verschil met gewone Bourgondische pap bestaat in een hooger sodex gehalte. Alcalische Bourgondische pap maakt men zelf uit  $1\frac{1}{2}$  kg kopervitriool en  $1\frac{1}{2}$  kg sodex op 100 liter water.

Uit proefnemingen, die eenige jaren achtereen zijn genomen, is gebleken, dat de alcalische Bourgondische pap een uitstekend middel is tegen den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. Als men bij het allereerste optreden van de ziekte, welke zich meestal het eerst aan de bessen van de onderste (druip) takken vertoont of beter nog even daarvoor, (begin Mei), onmiddellijk goed spuit, zoodat alle bessen flink aan alle kanten geraakt worden, (dus de struiken vooral van onder op) dan kan men er zeker van zijn, dat men gezonde bessen oogst.



Getracht wordt met dit middel ook de scheuten vrij van meeldauw te houden.

Bij fellen zonneshijn mag niet gespoten worden, daar dan kans op bladbeschadiging bestaat. Men spuiste het liefst in den namiddag.

**Californische pap.** Dit middel, waarin zwavel het werkzame bestanddeel is, wordt naast Bordeauxsche pap zeer veel gebruikt.

Vroeger werd pap van 20° Beaumé, welke men ook zelf kon maken, gebruikt. Thans gebruikt men uitsluitend pap van 30° Beaumé, welke men niet zelf kan bereiden. Deze pap is echter goedkoop bij handelaren in bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar. Van de sterkere pap heeft men minder noodig. De verdunningen, in de publicaties van den Plantenziektenkundigen Dienst opgegeven, gelden alleen voor de pap van 30° Beaumé.

Californische pap is een van de weinige middelen, die zoowel fungicide als insecticide eigenschappen bezitten.

Met een verdunning van 1 deel pap op 6 deelen water kan men 's winters de eitjes van bladluizen, schildluizen en mijten doodten.

Ook tegen schurft bij appel en peer wordt een winterbespuiting met 1 op 6 aanbevolen. Daar echter de voorjaarsbespuitingen met slappere en dus goedkoopere oplossingen voldoende zijn, wordt de winterbespuiting bij ons niet toegepast. Deze is veel te kostbaar, ook in vergelijking met carbolineum, waaraan men daarom als winterinsecticide algemeen de voorkeur geeft.

Een bespuiting met Californische pap 1 op 9 tegen het opengaan der bladknoppen is uitstekend ter bestrijding van de pokziekte bij peer en kort voor den bloei tegen rondknop bij zwarte bessen. De gevoelige soort Goliath moet men met 1 : 12 bespuiten.

1 op 12 wordt gebruikt tegen de krulziekte bij perzik minstens twee weken voor het opengaan der bloemknoppen.

Voor de tweede bespuiting tegen schurft bij appel (ook wel bij peer) wordt 1 op 80 gebruikt, voor een derde eventueel vierde bespuiting 1 : 100 à 1 : 165.

Tegen meeldauw (appel, Crataegus, roos, eik e.a.) is een bespuiting met 1 op 80 in den regel afdoende.

De zgn. meeldauw bij tomaten kan ook met 1 op 80 eenigszins bestreden worden. Het bezwaar is echter, dat de vruchten bezoedeld worden.

Bij bedekte lucht gebruikt men in kassen in den regel 1 op 80, bij zonneshijn mag men alleen 1 op 100 gebruiken.

**Solbar.** Dit middel kan zeer goed Californische pap vervangen. Het wordt als een bruinzwart poeder in den handel gebracht, met water gemengd (1 kg op 100 liter water) geeft het een bruin-

gele vloeistof met een uiterst fijn verdeeld zwart neerslag. De vloeistof moet men voorzichtig afschenken, anders gaat het neerslag mee, waardoor verstopping van den sproeidop veroorzaakt kan worden.

Roodkoperen pulverisateurs worden door zwavelpreparaten aangetast. Voor het spuiten met Californische pap, Solbar en dergelijke dient men dus uitsluitend de zgn. geelkoperen pulverisateurs te gebruiken.

**Shirlan A.G.** is een Engelsch middel, dat oorspronkelijk gebruikt werd om schimmelgroei op katoen en textielproducten te voorkomen. Door onderzoekingen is gebleken, dat het ook met succes tegen enkele schimmelziekten, vooral tegen Botrytis-aantastingen gebruikt kan worden.

Het werkzame bestanddeel is een kaliumverbinding van salicyl anilide; een goede uitvloeier is reeds aan deze stof toegevoegd.

Gebruikt moet worden een 0,8: oplossing. Het middel laat geen residu achter, kans op beschadiging is zeer gering.

**Salicylzuur.** Ofschoon dit middel weinig gebruikt wordt, is het ter bestrijding van meeldauw zeer geschikt. Meeldauw in rozen kan er heel goed mee bestreden worden. In den regel mengt men het dan met zeepsopspiritus.

10 g salicylzuur wordt eenigen tijd, voordat men gaat spuiten, in 100 cm<sup>3</sup> brandspiritus opgelost. Deze vloeistof mengt men met 10 liter water, waarin 2 ons zeep opgelost is.

Zooals reeds hier en daar is aangegeven kunnen fungiciden en insecticiden gemengd worden. Er zijn mengsels in den handel, door één bespuiting met een dergelijk middel bestrijdt men dan tegelijkertijd bepaalde zwammen en sommige insecten.

#### UITVLOEIERS

De gunstige werking van verschillende bestrijdingsmiddelen berust, zooals in hoofdstuk III wordt aangegeven, op een bevochtiging van de parasieten en hun eieren (contact-, ademhalings-, zenuwgif) of op een gelijkmatige bedekking van de plantendeelen met stoffen, welke deze dan beschermen tegen aantasting door zwammen en beschadiging door insecten (fungiciden, maaggiften).

Zoowel de bevochtiging en het indringen van de vloeistof in nauwe spleetjes en in wollige massa's (zwamweefsel, wasdraden van insecten) als de gelijkmatige verspreiding van vloeistoffen over gladde oppervlakten wordt in hooge mate bevorderd door toevoeging aan de sproeivloeistof van een goeden uitvloeier.

Verschillende stoffen kunnen als uitvloeier dienst doen. Deze stoffen veroorzaken een verlaging van de oppervlaktespanning en het gevolg daarvan is, dat de vloeistof niet in druppels samen-trekt maar als een dun laagje (film) gladde oppervlakten (blade-ren, vruchten) blijft bedekken.

De oppervlaktespanning is echter niet de eenige factor, ook de aard van het oppervlak en de samenstelling van de middelen, waaraan de uitvloeiers moeten worden toegevoegd, zijn van invloed op het verspreiden, het uitvloeien, van de sproeivloeistof.

Door een betrekkelijk eenvoudige meting van de oppervlaktespanning is een betrouwbare beoordeeling van de uitvloeiers niet mogelijk gebleken.

Een betere methode is het meten van de hoek, die druppels met het oppervlak, waarop zij liggen, maken. Hoe kleiner deze hoek is, des te beter vloeit de vloeistof *op dit bepaalde oppervlak* uit. Het kan echter zijn, dat de uitvloeijing van dezelfde vloeistof op verschillende oppervlakken niet dezelfde is.

Voor de beoordeeling van uitvloeiers is het derhalve noodig, dat zij op verschillende onderlagen (bladeren en vruchten van verschillende gewassen) en met verschillende bestrijdingsmiddelen gemengd beproefd worden.

Dit onderzoek is omvangrijk, er is een begin mede gemaakt, maar op dit oogenblik is het nog niet mogelijk de aangeboden uitvloeiers naar hun mate van uitvloeien te rangschikken.

Het zal waarschijnlijk blijken, dat voor bevochtiging van bepaalde oppervlakken en voor bepaalde middelen bepaalde uitvloeiers en voor bevochtiging van andere oppervlakken en voor andere middelen andere uitvloeiers gebruikt moeten worden.

Misschien bestaan er stoffen, die onder vrijwel alle omstandigheden, welke voor de bespuitingen tegen plantenziekten gelden, zullen voldoen; wellicht kunnen zij door menging van uitvloeiers worden verkregen, dat alles is echter nog niet bekend.

Er zijn aanwijzingen, dat terpeenalcoholen en misschien ook wel andere alcoholen en gesulfureerde vetzuren bijzondere gunstige eigenschappen voor uitvloeiers bezitten.

Toevoeging van een goeden uitvloeier bevordert de bevochtiging zoowel van parasieten als van plantendeelen.

De werking van de bestrijdingsmiddelen wordt daardoor beter en de resultaten van de bespuitingen ongetwijfeld gunstiger.

Bovendien is minder vloeistof noodig, mede in verband hiermede kan er vlugger gewerkt worden; er kunnen b.v. per uur meer boomen goed bespoten worden.

Een belangrijk voordeel is, dat gewassen met zeer gladde bla-

deren, welke vroeger vrijwel niet behoorlijk bespoten konden worden, nu wel voor bespuitingen in aanmerking komen.

Zoo kan de valsche meeldauw (*Peronospora*) bij uien en kunnen verschillende ziekten bij kool en andere ziekten van andere gewassen met zeer gladde bladeren thans bestreden worden, terwijl men er vroeger vrijwel machteloos tegen stond.

### III. HOE MOET DE BESPUITING WORDEN UITGEVOERD?

Alle besproeiingen kunnen niet op dezelfde wijze uitgevoerd worden. Bij de winterbespuitingen met carbolineum is het doel overwinterende diertjes of hun eieren te doden. Zorgvuldig moeten stammen, takken en twijgen, waar de overwintering plaats heeft, aan alle kanten terdege bespoten worden. De vloeistof moet met kracht de voorwerpen raken, dan dringt zij door tot in fijne spleetjes en scheurtjes, de schuilplaatsen van de parasieten. Bij een carbolineumbespuiting moet de sproeidop op korten afstand langs stam en takken bewogen worden. Het is niet gewenscht met carbolineum te spuiten tijdens vriezend of regenachtig weer. In het eerste geval bestaat er kans op beschadiging, in het tweede geval wordt de werking van het middel sterk verminderd.

Een bespuiting met een fungicide, b.v. Bordeauxsche pap, stelt daarentegen geheel andere eischen. Dit middel moet als een dun laagje de bladeren bedekken om te voorkomen, dat sporen, welke daarop neervallen, tot ontwikkeling zouden komen. De bespuiting met Bordeauxsche pap kan dus licht zijn, mits alles toch met de pap wordt bedekt.

Het is voldoende als een zeer dun laagje van de vloeistof op de bladeren terecht komt en daar indroogt. De meeste bladeren kunnen zulk een dun laagje door adhesie wel vasthouden. Een goede, fijne bedekking verkrijgt men door den sproeidop ver van de planten te houden. Op sommige gewassen met zeer gladde bladeren, o.m. uien en bloemkool, kan een bespuiting alleen succes hebben, als men een uitvloeier aan de oplossing toevoegt. De vloeistof vormt dan niet zoo gemakkelijk druppeltjes op de gladde bladeren, deze worden goed bevochtigd en door adhesie blijft de vloeistof op de bladeren hechten. Men moet, ook bij het gebruik van een uitvloeier, licht spuiten en den sproeidop ver van de planten houden. Vaak herhalen van de bespuiting is gewenscht.

De bespuitingen met fungiciden moeten eenige keeren plaats hebben om telkens de nieuw ontwikkelde bladeren met pap te bedekken of de van het oude blad af geregende pap te vervangen.

In ons land wordt tegen de schurftziekte bij appels en peren nog te veel slechts tweemaal of driemaal gespoten.

In de meeste jaren zijn vaker herhaalde bespuitingen noodig. De echte fruittelers gaan dit inzien, zij spuiten de laatste jaren 5, 6 en 7 keer. Bij deze veelvuldige bespuitingen kan men met 1%, soms met  $\frac{3}{4}$ % Californische pap volstaan.

Aardappels dienen tegen *Phytophthora* ook verscheidene keeren bespoten te worden. Het is gebleken, dat het optreden en de uitbreiding van de ziekte afhankelijk zijn van en samengaan met bepaalde weersomstandigheden. Tegenwoordig worden de aardappeltelers door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut in De Bilt door draadloze berichten gewaarschuwd, wanneer de omstandigheden voor de ziekte gunstig zijn. Er moet dan direct gespoten worden.

Een bespuiting met maagvergiften (loodarsenaat) kan ook zeer licht uitgevoerd worden. Bij deze bespuiting is het voldoende, dat kleine hoeveelheden van het vergif, doch liefst gelijkmatig verspreid, op de bladeren voorkomen. De vretende dieren krijgen dan toch steeds een doodende hoeveelheid in de maag.

Om goede resultaten te verkrijgen moeten de bespuitingen ook op het juiste tijdstip plaats hebben. Bordeauxsche pap en Alcalische Bourgondische pap, welke voorbehoedend werken, moeten eigenlijk verspoten zijn, voordat de ziekte optreedt. Aan dezen eisch kan niet steeds gemakkelijk voldaan worden. In verschillende gevallen is het voldoende te spuiten, zodra de eerste verschijnselen van de ziekte waargenomen worden. Het is echter vaak ook heel goed, het eerste optreden der ziekte niet af te wachten, maar voorbehoedend te spuiten, als de tijd er gunstig voor is.

De bespuiting met loodarsenaat tegen wormstekigheid is ook nauw aan den tijd gebonden. Het rupsje van de wormstekigheid vreet zich meestal door de kelkholte naar binnen. Op die plaats moet dus het maagvergif zich bevinden op het moment, dat de rupsjes uit de eitjes komen. Dit is alleen te bereiken, als men onmiddellijk na den bloei spuit. Betrekkelijk korten tijd na den bloei krommen zich de kelkbladeren, waardoor zij de kelkholte afsluiten. Als dit omkrullen van de kelkbladeren reeds plaats gehad heeft, is een bespuiting vrijwel nutteloos.

Overigens spuit men met arsenicum-preparaten, zodra vreterij optreedt. Moet een bespuiting plaats hebben op plantendeelen, die als voedsel moeten dienen, dan mag men niet meer spuiten als deze plantendeelen binnen vier weken na de bespuiting genuttigd moeten worden. Ook op de ondercultures moet gelet worden, het hoofdgewas kan niet meer met een maagvergif



worden bespoten, als de ondercultures (aardbeien) binnen een maand na de bespuiting gegeten zullen worden.

De bespuiting met maagvergiften mag men ook *nooit tijdens den bloei* uitvoeren, omdat dan het gevaar voor bijen-vergiftiging te groot is. Bij fellen zonneschijn spuite men niet. Bladverbranding is dan niet buitengesloten. De namiddag is voor het spuiten het meest geschikt.

#### IV. SPROEIWERKTUIGEN

Tegelijk met het toenemend gebruik van sproeimiddelen heeft de techniek der sproeiwerktuigen zich krachtig ontwikkeld. De eenvoudige en onvoldoend werkende hulpmiddelen van vroeger zijn thans vervangen door apparaten, zoowel voor kleine tuinen als voor grootere bedrijven en voor het grootbedrijf, die aan hooge eischen voldoen.

In het begin heeft men zich van zeer primitieve gereedschappen bediend. Een bosje takken, samengebonden als een stalbezem, was reeds geschikt om de vloeistoffen op de planten te werpen. Telkens werd het bosje in de vloeistof gedompeld en de aanhechtende druppels over de planten geslingerd.

Een verbetering was het apparaat, bestaande uit een platte borstel met een slang verbonden aan een reservoir, dat op den rug gedragen kon worden. De vloeistof vloeiende langzaam in de borstel, zoodat regelmatig de planten besprenkeld konden worden.

Ook gebruikte men wel eens een gieter om de planten te bevochtigen. Het bezwaar was echter, dat men te veel vloeistof verbruikte, dat de vloeistof toch niet voldoende alle deelen der plant bevochtigde, niet voldoende ook in reten en holten doordrong en dat planten, die een vrij groote hoogte bereikten, niet behandeld konden worden.

Daarna is een eenvoudige spuit, de zgn. **kasspuit**, zooals men ook tegenwoordig nog wel gebruikt, gekomen. Het instrument bestaat uit een koker, waarin een zuiger op en neer bewogen kan worden. Bij het ophalen van den zuiger zuigt men de koker vol vloeistof, door het neerdrukken van den zuiger perst men de vloeistof door dezelfde opening, waardoor zij naar binnen kwam, met kracht weer uit. Op die wijze kan men de vloeistof op vrij grooten afstand verspuiten en al naar het mondstuk is, grover of fijner verdeelen.

Een moeilijkheid levert het richten met een dergelijke spuit. Door de groote kracht, welke noodig is om de vloeistof ver te verspuiten, is het zeer lastig een bepaalde richting te houden.

Deze moeilijkheid werd overwonnen door de uitvinding van den *pulverisateur*. Er waren vrijwel gelijktijdig enkele typen, van welke die van Vermorel (Pl. I, fig. 1) wel de bekendste is.

Het instrument wordt op den rug gedragen, zoodat men de handen vrij heeft. Met de eene hand kan men de pomp in werking stellen, terwijl men met de andere hand de sproeislang zeer gemakkelijk kan richten.

De vloeistof bevindt zich in een vrij plat reservoir, waaruit zij door een ventiel komt in een ruimte, waarin de pompinrichting geplaatst is.

Het voornaamste onderdeel van deze pompinrichting is een gummivlies (membraan), dat door een hefboom in en uit gestulpt kan worden. Door de bewegingen van het vlies wordt beurtelings een hoeveelheid vloeistof uit het reservoir gezogen en daarna in een luchtkamer geperst. Van daaruit stroomt zij met kracht in de sproeislang.

De luchtkamer zorgt er voor, dat onder een regelmatigen druk gespoten kan worden. Zonder die inrichting zou de vloeistof, in het tempo van de pomp bewogen, met golfjes naar buiten komen.

Voor het besproeien van aardappels met Bourgondische pap wordt deze pulverisateur nog tamelijk veel gebruikt.

De „Besnard” is een pulverisateur, die in vorm overeenkomt met de Vermorel, doch in werking geheel afwijkt. De „Besnard” heeft geen membraan, doch een zuiger, welke zich niet in de pulverisateur bevindt, doch in een zuigerbuis, welke naast het reservoir is aangebracht en daarin op en neer bewogen wordt. Het voordeel van deze constructie is, dat bij een defect aan de pompinrichting herstellingen vrij gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De **automatische pulverisateur**, waarin, nadat het instrument met vloeistof gevuld is, lucht gepompt wordt tot een spanning, die voldoende is om alle vloeistof er uit te drijven, is weer een verbetering van het vorige type.

Deze pulverisateur bezit weinig gummi-onderdeelen. Dit werd van groote beteekenis, toen carbolineum als bestrijdingsmiddel algemeen toegepast werd. Carbolineum toch tast rubber aan. De pulverisateur van Vermorel, die tamelijk veel gebruikt wordt voor het verspuiten van Bourgondische pap (op aardappelen), is door het bezit van een gummi membraan voor het verspuiten van carbolineum ongeschikt.

De automatische pulverisateur (Pl. I, fig. 3) bestaat uit een cilindervormig reservoir, waarbinnen zich een luchtpomp bevindt. Het handvat van de pomp bevindt zich op den kop van het reservoir. Door een opening, welke zich ook in den kop van

het reservoir bevindt, wordt het reservoir voor  $\pm \frac{2}{3}$  met vloeistof gevuld.

Nadat deze opening goed is afgesloten, pompt men in het reservoir lucht, die in de ruimte boven de vloeistof terecht komt. Men pompt zoolang tot een druk van 4 à 5 atmosferen, op de manometer met een roode streep aangegeven, is bereikt. Dan is het instrument voor het gebruik klaar. Nadat het instrument leeg gespoten is, moet men de overvloedige lucht voorzichtig laten ontsnappen, voordat het opnieuw gevuld kan worden.

Deze pulverisator wordt ook op den rug gedragen, zoodat men nu beide handen vrij heeft. Met de rechterhand houdt men de sproeislang vast, de linkerhand kan men dan nog gebruiken om takken uiteen te buigen of van den grond op te heffen (bessestruiken), zoodat men in staat is de plantendeelen, welke bespoten moeten worden, van alle kanten goed te raken.

Sommige sproeislangen worden met een kraan (zie Pl. II, fig. 8), andere met een druksluiting (zie Pl. II, fig. 7), afgesloten. Het voordeel van de druksluiting is, dat men met één hand de sproeiopening kan openen en sluiten. Het voortdurend drukken op de hefboom is echter vermoeiend en daarom geven velen de voorkeur aan een kraan, ofschoon men voor het openen en sluiten dan beide handen noodig heeft.

De Calimax (Platz), de Holder (Holder) en de Pomonax (Altmann) zijn de bekendste pulverisateurs, tot dit type behorende, welke in ons land gebruikt worden.

Bij deze typen, die als gemeenschappelijk principe hebben, dat lucht wordt geperst in een met vloeistof gevuld reservoir, zijn slechts vorm, pompinrichting e.d. verschillend.

Tot een ander systeem behooren de pulverisateurs, waarin eerst lucht tot een spanning van  $1\frac{1}{2}$  à 2 atm. wordt geperst en waarin daarna, met dezelfde pomp, zooveel vloeistof wordt gepompt tot de druk 6 à 10 atm. is geworden.

Zoodra de vloeistof verspoten is, sluit zich het afvoerventiel, zoodat de lucht niet ontsnappen kan.

Men behoeft dus slechts eenmaal lucht en vervolgens telkens vloeistof bij te pompen.

Bij de Muratori, welke tot dit type behoort, bevindt zich de pomp naast het vloeistofreservoir. Dit type wordt in ons land, vooral in Aalsmeer en in het Westland, tamelijk veel gebruikt.

De Matador, welke eveneens tot dit type behoort, wordt ook wel in ons land gebruikt. De pomp bevindt zich in het reservoir, de zuigerstang kan door middel van een hefboom, welke het pompen vergemakkelijkt, op en neer bewogen worden.

Bij enkele Belgische pulverisateurs van dit type bevindt zich

de zuigpomp in de sproeibuis, welke van koper is. Nadat de lucht ingepompt is, plaatst men de sproeibuis in de vloeistof en pompt dan de noodige hoeveelheid vloeistof in het reservoir.

Het spuiten met dit werktuig is vermoeiend, daar een koperen sproeibuis veel zwaarder is dan een gummi-slang.

De **batterij spuiten** (Pl. II, fig. 5) bestaan uit een serie pulverisateurs van het hiervoor beschreven type. De reservoirs hebben den gewonen vorm van de automatische pulverisateurs, maar zij bezitten geen pomp.

Zij worden ter vulling op een stellage boven een groot vloeistof-reservoir geplaatst; door middel van een pomp met langen hefboom, welke op dit reservoir bevestigd is, wordt eerst lucht (2 atm.) ingepompt, daarna wordt een slang, welke in de vloeistof hangt, aan één der pulverisateurs gekoppeld en dan wordt vloeistof ingepompt. Er wordt zooveel vloeistof bijgepompt tot een spanning van 10 atm. bereikt is. Het reservoir wordt nu als gewone pulverisator op den rug gehangen en de vloeistof op dezelfde wijze daaruit verspoten. Terwijl het eene instrument wordt leeg gespoten kan een volgend worden gevuld; de batterij-sputten maken het dus mogelijk, dat onafgebroken kan worden gewerkt.

Als de pulverisator is leeggeloot, wordt het ventiel, evenals bij de andere typen gesloten, zoodat de lucht niet ontsnappen kan.

Er zijn verschillende eischen, waaraan pulverisateurs moeten voldoen. In de eerste plaats degelijke afwerking, zoodat de hooge druk geen gevaar kan opleveren.

De in ons land meest gebruikte merken voldoen aan dezen eisch. Het komt slechts zelden voor, dat een instrument niet den vereischten druk kan weerstaan. De aanwezigheid van een manometer is echter zeer gewenscht om te voorkomen, dat men het reservoir onder te hoogen druk brengt.

In de tweede plaats moeten er zoo weinig mogelijk, liefst in 't geheel geen, gummi-onderdeelen gebruikt worden.

Het vrij algemeene gebruik van carbolineum maakt het stellen van dezen eisch noodig. Carbolineum tast het gummi aan, zoodat dergelijke onderdeelen spoedig onbruikbaar worden, waardoor ook het geheele instrument onbruikbaar wordt. In sommige pulverisateurs komen nog wel ventielen met gummikogels voor. Deze moeten door koperen of glazen kogels vervangen worden.

In de derde plaats moet het metaal, waarvan de pulverisateurs gemaakt worden, bestand zijn tegen de verschillende sproeivloeistoffen, die er in gebruikt zullen worden. Bourgondische pap en Californische pap stellen in dit opzicht bijzondere eischen. Bourgondische pap tast ijzer vrij sterk aan, terwijl ook zink en tin niet tegen deze pap bestand zijn. Ook gegalvaniseerd (ver-

tind) ijzeren pulverisateurs zijn dus voor Bourgondische pap ongeschikt. Roodkoper kan niet gebruikt worden, omdat het door Californische pap aangetast wordt. Het is beslist verkeerd om een roodkoperen pulverisateer langeren tijd voor het verspuiten van Californische pap te gebruiken.

Een legering, die wel tegen Californische pap bestand is, heeft men gevonden in het zgn. California-metaal (geelkoper).

Deze legering is een mengsel van koper, zink en tin.

De zgn. geelkoperen pulverisateurs zijn tegen alle gebruikelijke bestrijdingsmiddelen bestand. Met één instrument kan men dus alle noodige vloeistoffen verspuiten.

Lood is ook tegen alle gebruikelijke bestrijdingsmiddelen bestand. Dit metaal gebruikt men daarom wel om er de wanden van ijzeren pulverisateurs mee te bekleden.

*Bij het aanschaffen van pulverisateurs koope men dus uitsluitend de geelkoperen of de met lood bekleede instrumenten.*

De vloeistofinhoud van de tot nu toe besproken pulverisateurs bedraagt ongeveer 12 liter. Bij een druk van  $\pm 4$  atmosferen wordt deze inhoud in  $\pm 6$  minuten uitgespoten. Het vullen en op druk pompen duurt 4 à 8 min., zoodat een spuit 10 à 15 min. noodig heeft om een pulverisateer te vullen en leeg te spuiten. Weet men nu, dat voor een flinke struik  $\pm 20$  liter noodig zijn, dan kan men uitrekenen hoeveel tijd men noodig heeft voor het bespuiten van een bepaalde fruitaanplanting. Voor bezitters van kleine tuinen zijn deze instrumenten te groot. Voor hun doel zijn beter geschikt de pulverisateurs met kleineren inhoud (7 liter) Voor zeer kleine tuintjes zijn ook deze nog te groot. Dan zijn kleine handpulverisateurs van  $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$  liter inhoud (Pl. I, fig. 2) meer geschikt.

In kassen en in kleine tuinen kan in plaats van een rugpulverisateer een *voetpomp* gebruikt worden. De pompbuis wordt in het vloeistofreservoir (emmer, vat) geplaatst met den voetsteun naar buiten, men pompt als bij een fietspomp. De vloeistof wordt door een lange slang geperst, waardoor de spuit groote vrijheid van beweging heeft, terwijl de persoon, die de pomp bedient, op één plaats blijft staan.

Een daarop gelijkendapparaat is de *Solo sproeier*. Bij dit instrument is de pomp in de sproeipijp aangebracht; het voordeel is, dat slechts één persoon voor het sproeien noodig is, bij de voetpomp zijn twee personen noodig. Een bezwaar is, dat het pompen tamelijk vermoeiend is.

Voor het besproeien van aardappels met Bourgondische pap tegen *Phytophthora infestans* wordt in streken, waar de cultuur niet op smalle akkers (zooals in Friesland) gedreven wordt, ge-



bruik gemaakt van **paardensproeimachines** (Pl. III, fig. 9).

Het reservoir is geplaatst op een onderstel, waarvan één der wielen langs de as veresteld kan worden, men kan den afstand tusschen de wielen dus regelen in verband met de plantwijdte der aardappels.

De pomp wordt aangedreven door een kracht, welke ontleend wordt aan de draaiende wielen. In het reservoir is een roerinrichting, die ook door de draaiende wielen in beweging wordt gebracht.

Achter het reservoir bevindt zich een lange sproeipijp, waaraan op onderling gelijke afstanden verstuivers zijn aangebracht. Sommige machines bezitten zoowel hoog geplaatste naar beneden gerichte als laag geplaatste naar boven gerichte sproeiers. Deze laatste beschadigen het loof bij een welig ontwikkeld gewas vrij ernstig; het is gebleken, dat met boven-sproeiers alleen volstaan kan worden.

Hoe breeder de strook is, die in één gang besproeid kan worden, hoe beter. Men behoeft dan minder vaak door het gewas te rijden. Een breede sproeipijp verdient dus aanbeveling.

De sproeibuis moet ook liefst verstelbaar zijn, bij een hoog gewas kan men de buis dan hooger stellen. Het is nl. gewenscht, dat de sproeivloeistof uiterst fijn verdeeld op de bladeren terecht komt. Dit bereikt men alleen als de afstand tusschen de sproei-dop en de bladeren niet te klein is.

Voor een grondige bespuiting van boomgaarden zijn de rugpulverisateurs onvoldoende gebleken. In ons klimaat zijn de perioden, welke voor het spuiten gunstig zijn, vaak van korten duur. Wel kan men met carbolineum van December tot Maart spuiten, maar gedurende die maanden zijn er toch maar betrekkelijk weinig goede spuitdagen. De eerste bespuiting tegen schurft moet kort voor den bloei plaats hebben, de tweede bespuiting tegen schurft moet, als zij tevens ter bestrijding van de wormstekigheid zal dienen, binnen tien dagen na den bloei uitgevoerd worden. Tegen vretende insecten moet direct als de vreterij begint, gespoten worden. Een goede bestrijding eischt dus een snelle uitvoering van de werkzaamheden. Met gewone rugpulverisateurs is dat, wanneer een groot aantal boomen bespoten moet worden, niet mogelijk.

De **rijdbare sproeimachines** (Pl. II, fig. 6) waren reeds een groote verbetering. Zij hebben een grooter reservoir en een krachtiger pomp, die het mogelijk maakt met twee slangen te spuiten. Door middel van een langen hefboom, die door één man bewogen kan worden, wordt de zuig-perspomp in werking gebracht. Bij den opgaanden slag wordt vloeistof in de cylinders gezogen, bij

den neergaanden slag wordt de vloeistof in den windketel geperst.

De windketel dient om een gelijkmatigen druk van  $\pm 10$  atm. te verkrijgen, zoodat de vloeistof voortdurend en met kracht verspoten wordt. Op den windketel bevindt zich de aansluiting voor de slangen, terwijl daar ook de manometer aangebracht is, die den persdruk aangeeft.

Deze pompen zijn gemonteerd op rijdbare houten, geelkoperen of verlood ijzeren reservoirs van het kruiwagen model (Rhenania, Teutonia, Weeks e.a.).

Ook zijn ze wel aangebracht op een houten vat (Pl. I, fig. 4), dat op een kar, een lorrie of op een speciaal wielstel (met kipbare ophanging) geplaatst kan worden.

Op deze wijze kan men met betrekkelijk lage kosten een verplaatsbare spuit met vrij groote capaciteit maken. De montageering op het vat heeft ook het voordeel, dat de pomp gemakkelijk uitgenomen en schoongemaakt kan worden. Het deksel van het vat moet ook uitneembaar zijn, daar anders het vat inwendig niet goed schoongemaakt kan worden.

Ervaren spuiters kunnen met een vatspuit 1 à 2 ha boomgaard per dag behandelen. Er zijn dan vier personen noodig, nl. twee spuiters, één pomper, en één jongen die geregeld de sproeivloeistof klaar maakt en in het vat giet. Hij kan tevens behulpzaam zijn bij het voortrijden van de spuit.

Hoewel de rijdbare sproeimachines voor niet te groote boomgaarden of voor fruittuinen met ondercultuur van bessen ongetwijfeld zeer bruikbare instrumenten zijn, moeten ze toch meer en meer wijken voor de motorsproeimachines. Het is den fruittelers duidelijk geworden, dat, willen zij de Nederlandsche markt voor het inlandsche fruit behouden en den afzet naar het buitenland weer doen toenemen, de kwaliteit van ons fruit zeer veel moet verbeterd worden. De noodzakelijkheid van een krachtige schurftbestrijding, waarvoor jaarlijks verscheidene besputingen noodig zijn, wordt meer en meer door de meeste fruittelers gevoeld. Voor een goede uitvoering van deze besputingen, vooral voor het op het juiste tijdstip spuiten, zijn de motorsproeimachines onmisbaar.

Vele bezitters van groote boomgaarden hebben zich zelf zoo'n machine aangeschaft, een enkele keer wordt coöperatief een motorspuit gekocht, terwijl ook verschillende fruittelers de besputingen door zgn. loonspuiters laten uitvoeren. Het stelsel van een loonspuitery heeft zich erg sterk uitgebreid. Bij een goede contrôle op de te gebruiken middelen en een garantie voor het op tijd spuiten heeft het stelsel ongetwijfeld voordeelen, maar niet onvermeld mag blijven, dat het ook nadeelen heeft. (zie blz. 54)

De **motorsproeimachine** kan zoowel rijdend als stationnair (blijvend op één plaats opgesteld) zijn.

Bij beide typen onderscheidt men: 1° het vloeistofreservoir, waarin een roerinrichting is aangebracht; 2° de pomp en 3° de motor om de pomp aan te drijven.

1° Het *reservoir* kan verschillende vormen en afmetingen hebben. Bij de rijdbare spuiten varieert de inhoud van 330 liter tot 1000 liter.

Er bestaan spuiten met een houten en andere met een metalen reservoir. Hout wordt door geen enkele sproeivloeistof aangetast, men zal echter moeten zorgen, dat het hout steeds eenigszins vochtig blijft, om krimpen en lek worden te voorkomen.

Metalen reservoirs zijn waarschijnlijk duurzamer. Zij moeten van een bijzondere koperlegeering (koper, zink en tin), die ook tegen alle sproeivloeistoffen vrijwel volkomen bestand is, vervaardigd zijn.

Het *roerapparaat* bestaat meestal uit een as, die dicht bij den bodem in de lengte richting door het reservoir loopt. Op deze as, die door de motor matig snel bewogen wordt, zijn schoepen aangebracht. Als de motor werkt, wordt de vloeistof dus voortdurend in beroering gebracht, zoodat fijnverdeelde stoffen, die in de vloeistof zweven (Bordeauxsche pap, loodarsenaat) niet zoo snel kunnen bezinken.

2° De meeste motorsproeimachines zijn voorzien van *plunjer* (zuiger) *pompen*.

Door de op- en neer- of heen- en weergaande beweging van den plunjer (zuiger) wordt vloeistof uit het reservoir aangezogen en weggeperst naar een windketel. Als de doorsnede van den plunjer

$D$  is, dan is de oppervlakte  $\frac{\pi D^2}{4}$ . Bij een afstand  $s$  tusschen de uiterste plunjerstanden, is de hoeveelheid vloeistof, die bij één zuigerslag aangezogen wordt  $\frac{\pi D^2}{4} \times s$ .

In de pompen met twee cylinders (niet te verwarren met de cylinders van den motor, die de pomp aandrijft,) welke dan meestal in elkanders verlengde liggen, is elke zuigerslag tevens een persslag. Bij elke beweging van den zuigerstang wordt dus ook een

hoeveelheid vloeistof  $= \frac{\pi D^2}{4} \times s$  weggeperst. Als het aantal zuigerslagen per minuut  $n$  bedraagt, is de hoeveelheid vloeistof, die de pomp per minuut kan leveren dus  $\frac{\pi D^2}{4} \times s \times n$ . Deze

theoretische maximale hoeveelheid levert de pomp nooit, er heeft altijd in de pomp eenig verlies plaats.

Het hangt, zooals nog nader uiteengezet zal worden, van verschillende omstandigheden af of de hoeveelheid vloeistof, die de pomp kan leveren, ook werkelijk verspoten wordt.

Er zijn motorsproeimachines, welke van een centrifugaalpomp voorzien zijn, in den handel. Zij worden echter weinig gebruikt, blijkbaar voldoen zij niet. De slijtage der pompen, die een zeer hoog toerental hebben, is bij vloeistoffen, waarin scherpe deeltjes (zand, stukjes kalk e.d.) voorkomen, vermoedelijk te groot.

3° Voor het aandrijven van de pompen worden bijna uitsluitend benzine-motoren gebruikt. Enkele machines zijn voorzien van een ruw-olietmotor, terwijl bij stationnaire machines ook electro-motoren in gebruik zijn.

Bij de benzine-motoren onderscheidt men twee- en viertakt motoren.

Het aantal omwentelingen van de motoras is grooter dan het aantal omwentelingen van de as van de pomp; door de verschillende tandraden wordt de noodige vertraging tot stand gebracht. Bij motoren met een hoog toerental (groot aantal omwentelingen per minuut) moet de vertraging natuurlijk veel grooter zijn dan bij motoren met een laag toerental. Het toerental van de in ons land gebruikte motoren loopt van 3000 (tweetakt) Pl. VI, fig. 15 tot 1000 à 600 (viertakt) Pl. VI, fig. 16 en Pl. VII, fig. 17. In het algemeen neemt men aan, dat de slijtage bij de snelloopende motoren grooter zal zijn dan bij de langzamerloopende. De duurzaamheid hangt echter, afgezien nog van de behandeling en verzorging, ook van andere factoren (materialen, smering e.d.) af, zoodat men niet zonder meer aan de viertakt machines een langeren levensduur dan aan de tweetakt kan toeschrijven.

Aan de motorsproeimachines zijn meestal twee slangen gekoppeld. Aan de slangen worden of sproeigeweren (Pl. II, fig. 7 en 8) of meervoudige verstuivers (Pl. III, fig. 10) bevestigd. De sproeigeweren bestaan uit een koperen buis, aan welks einde een bijzondere sproeidop is aangebracht. De uitlaatopening kan, ten einde de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, te regelen, grooter en kleiner gemaakt worden, door schijfjes met een grooter of kleiner gaatje aan het uiteinde van de sproeibuis te plaatsen. Op eenigen afstand van het ingezette schijfje bevindt zich in de sproeibuis een schijfje met een aantal schuingeboorde gaatjes. Bij het passeeren van deze gaatjes krijgt de vloeistof een draaiende beweging, uit de sproeiopening ontwijkt deze sneldraaiende vloeistof als een nevel (breede verspreiding). Het plaatje met de schuingeboorde gaatjes kan naar het schijfje met de sproeiopening toe bewogen worden, hoe dichter de plaatjes elkander naderen

hoe meer de nevel in een straal (smalle verspreiding) overgaat.

In het laatste geval wordt de vloeistof tot groote hoogte (12 à 15 m) met groote kracht verspoten, in het eerste geval wordt de vloeistof over een groote breedte, doch minder hoog, verspoten. Voor verschillende doeleinden zijn de sproeigeweren dus bruikbaar.

Het verplaatsen der schijfjes geschiedt bij de Amerikaansche sproeigeweren door een draaibeweging, bij de Duitsche instrumenten door een drubbeweging. De eerste zijn gemakkelijker in het gebruik en zijn daarom te verkiezen boven de laatste.

De lengte der sproeigeweren varieert van  $\pm 60$  cm tot 1,50 m. Ofschoon de lange natuurlijk zwaarder zijn, acht men ze toch practischer, daar men een beter gezicht op het spuiten heeft.

De *meervoudige verstuivers* (Pl. III, fig. 10), welke uit een T-vormige sproeistok met drie of meer sproeidoppen bestaan, voeren de vloeistof niet zoo hoog op als de sproeigeweren.

De lengte der slangen kiest men in overeenstemming met den aard van het bedrijf. In boomgaarden met gras, waar men met de machine gemakkelijk tusschen de rijen kan door rijden, kunnen vrij korte slangen gebruikt worden; in den regel gebruikt men dan slangen van 15 à 20 m lengte, afhankelijk van den afstand, waarop de boomen zijn geplant.

In boomgaarden met bessen als onderbeplanting of in fruittuinen met struiken, waar de machine niet zoo gemakkelijk verplaatst kan worden, komt men er toe langere slangen te gebruiken. De machine rijdt dan b.v. langs het hoofdpad en de aanplantingen aan weerszijden daarvan worden strooksgewijs bespoten. De lengte der slangen moet dan iets grooter zijn dan de breedte der perceelen langs het hoofdpad.

De lengte der slangen kan echter niet willekeurig grooter genomen worden, er zijn grenzen. Door de wrijving van de vloeistof langs de wanden van de slang, heeft er drukverlies plaats. Hoe wijder de slangen en hoe gladder de wanden zijn, des te geringer is het drukverlies.

De druk neemt af volgens de formule  $w = \lambda \times \frac{1}{d} \times \frac{v^2}{2g}$ .

In deze formule is  $\lambda = a + \frac{0,0018}{\sqrt{vd}}$  voor slangen en buizen met gladden wand is  $a = 0,02$ .

$v$  = de snelheid van de vloeistof in meters per seconde.

$d$  = doorsnede slang of buis in meters.

$l$  = de lengte van slangen of buizen.

$g$  = versnelling zwaartekracht = 9,81.

I. Als per minuut 40 liter verspoten wordt is de snelheid in slangen met een doorsnede van  $\frac{1}{2}$  duim  $v = 5,85$  m per seconde.



II. Wordt er 20 liter per minuut verspoten, dan is de snelheid in slangen van - duim  $v = 2,92$  m per seconde.

$$\text{In geval I is } \lambda = 0,02 + \frac{0,0018}{\sqrt{5,85 \times 0,012}} = 0,0268.$$

$$\text{dus } w = 0,0268 \times \frac{1}{0,012} \times \frac{5,82^{\frac{3}{2}}}{2 \times 9,81} = 3,91.$$

$$\text{In geval II is } \lambda = 0,02 + \frac{0,0018}{\sqrt{2,92 \times 0,012}} = 0,0296.$$

$$\text{dus } w = 0,0296 \times \frac{1}{0,012} \times \frac{2,92^{\frac{3}{2}}}{2 \times 9,81} = 0,971.$$

De beteekenis van deze cijfers is, dat het drukverlies per m lengte van de slang in geval I  $3,91 \times 0,1$  atm., in geval II  $0,971 \times 0,1$  atm. is.

Voor een slang van 10 m lengte is het drukverlies in geval:

$$\text{I } 10 \times 3,91 \times 0,1 \text{ atm.} = \pm 4 \text{ atm.}$$

$$\text{II } 10 \times 0,971 \times 0,1 \text{ atm.} = \pm 1 \text{ atm.}$$

Moet men, in verband met de omstandigheden, ver van de machine spuiten, dan is men genoodzaakt slangen met grooter diameter te gebruiken. Onder dergelijke omstandigheden kan het systeem van een buizenleiding, dat nog nader behandeld zal worden, wenschelijk zijn.

**Vloeistof verbruik.** Er is reeds op gewezen, dat de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, niet gelijk is aan de hoeveelheid, die de pomp kan leveren. De hoeveelheid verspoten vloeistof hangt af van den druk, waaronder de vloeistof den sproeidop verlaat, van den diameter van de sproeiopening (dus van de grootte van het gaatje) en van de zgn. contractie-coëfficiënt, die weer verband houdt met den vorm en de grootte van de sproeiopening, wijde der slangen en den aard van de sproeivloeistof.

Als de pomp in den windketel meer vloeistof perst dan er verspoten wordt, moet de druk natuurlijk toenemen. Om te voorkomen, dat de druk te groot zou worden en de ketel uit elkander zou springen, is een veiligheidsklep aangebracht, die bij een bepaalden druk geopend wordt.

Het te veel aan vloeistof wordt dan òf naar het reservoir teruggevoerd òf het blijft in de pomp circuleeren, al naar de constructie van de pomp.

De veiligheidsklep wordt al spoedig geopend, als de sproeikranen gesloten worden, terwijl de motor blijft loopen b.v. als de spuiters van den eenen naar den anderen boom gaan; zonder veiligheidsklep zou telkens als men even met spuiten ophield, de motor afgezet moeten worden. Een regelmatig verloop van de werkzaamheden zou dan niet mogelijk zijn.

Het kan echter ook gebeuren, dat de veiligheidsklep geopend

wordt, terwijl er nog gespoten wordt. De pomp levert dan voortdurend meer vloeistof dan verspoten wordt. Als het overschot gering is, kan er geen overwegend bezwaar tegen gemaakt worden; het bewijst, dat de kracht van de motor meer dan voldoende is om de verlangde arbeid te presteeren, m.a.w. er behoeft van den motor niet het uiterste gevegd te worden. De levensduur is in een dergelijk geval grooter dan van een motor, die steeds tot het uiterste belast is. Is het overschot echter groot, dan verricht de motor onnoodig werk en wordt meer benzine gebruikt dan noodig is.

Gedeeltelijk kan dit voorkomen worden door den motor langzamer te laten loopen, men moet er daarbij op letten, dat er voldoende druk in den windketel blijft. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet men niet den motor langzamer laten loopen (de hoeveelheid vloeistof, die de pomp levert, kleiner maken) doch de sproeiopening grooter maken (de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, grooter maken). De invloed, die de sproeiopening heeft, blijkt wel uit de volgende cijfers:

Een sproeigeweer met een opening van  $\frac{4}{64}$  inch (1,6 mm) kan  $\pm 9$  liter vloeistof per minuut geven.

Een sproeigeweer met een opening van  $\frac{5}{64}$  inch (2 mm) kan  $\pm 18$  liter vloeistof per minuut geven.

**Voortbeweging.** De rijdbare motorsproeimachines worden meestal door één paard getrokken. In sommige gevallen (machines met groot reservoir, zachte bodem) zal men wel twee paarden noodig hebben. Het plaatsnemen van de machine op een onderstel met luchtbanden verdient aanbeveling, niet alleen omdat daardoor de trekkracht verminderd kan worden, maar ook omdat dan bij verplaatsing over harde wegen (loonsproeiers) de machines minder lijden.

Er zijn ook motorsproeimachines, die zelfbewegend zijn. De motor wordt dan tevens benut voor de voortbeweging. In ons land hebben deze machines nog geen opgang gemaakt, maar wel worden de motorsproeimachines op een autochassis gemonteerd. Voor loonsproeiers zijn deze machines, die snel verplaatst kunnen worden, zeer geschikt.

In streken, waar de akkers slechts per boot bereikbaar zijn (de Streek, de Langendijk) plaatst men den motor in een boot, waarin ook het vloeistofreservoir een plaats moet vinden. De slangen, welke op een rondsel gewonden zijn, trekt men, zoover het noodig is, op de akkers. Men kan dan telkens een strook, die loodrecht op de sloot staat, bespuiten. Begint men zoover mogelijk van de sloot af, dan kan onder het spuiten de slang langzaam op het rondsel gewonden worden tot men de sloot weer genaderd is. De

boot wordt dan eenige meters verplaatst, waarna men een aangrenzenden strook kan bewerken.

Bij deze methode moet men er ook aan denken, dat de slangen, in verband met de vermindering van den druk, niet te lang mogen zijn.

Het **vullen der reservoirs** geschiedt met behulp van de pomp. Bij de methode, die vroeger uitsluitend en tegenwoordig nog wel wordt gevolgd, wordt een slang, waarvan het ondereinde, van een zeef voorzien, in de sloot ligt, aan de pomp verbonden. De pomp zuigt het water op en perst het naar het reservoir. Voor het vullen van een reservoir met een inhoud van  $\pm 300$  liter is ongeveer 7 minuten noodig.

Flugger geschiedt het vullen met behulp van een *injecteur*. In een houten zuigkorf, waaraan twee slangen verbonden kunnen worden, bevindt zich een haakvormig omgebogen buis. Het spits toeloopende einde van deze buis mondt uit in een ruimte, welke zich bevindt tegenover een tweede buis. De eerste, haakvormige, buis wordt met een der slangen aan de pomp gekoppeld, de tweede buis wordt met de andere slang aan het reservoir verbonden.

Stelt men nu de pomp in werking, dan wordt een kleine hoeveelheid vloeistof uit het reservoir, dat nooit heelemaal leeggespoten mag worden, geperst door de haakvormige buis. Het spuit door het conische mondstuk met kracht in de ruimte, waarin de lucht sterk verdund wordt. Hierdoor wordt het water uit de sloot, waarin de zuigkorf ligt, aangezogen en met de persvloeistof naar het reservoir gevoerd.

Door een kleine hoeveelheid vloeistof, welke onder hoogen druk uit het reservoir wordt gepompt, wordt een groote hoeveelheid water onder lagen druk in het reservoir gebracht.

Bij een perscapaciteit van de pomp van ca 25 liter per minuut bedraagt de zuigcapaciteit van den injecteur ongeveer 100 liter per minuut. Een reservoir van  $\pm 300$  liter kan met den injecteur dus in  $\pm 3$  minuten volgepompt worden.

**Vaststaande motoren.** In streken, waar de machine moeilijk verplaatst kan worden, b.v. in fruitplantages met onderbeplanting, of waar men lange smalle akkers heeft, die slechts aan één der korte zijden aan het water grenzen, is men aangewezen op een vaststaanden motor met een buizenleiding. Deze buizenleiding kan vastliggen, o.a. op smalle akkers, waar men dan slechts een rechte leiding, met kranen op verschillende plaatsen, noodig heeft, maar ook kan men (b.v. op breedere perceelen), gebruik maken van verplaatsbare leidingen. Men moet het stelsel, door gebruikmaking van driewegkranen, zoo inrichten, dat tijdens het spuiten gedeelten van de leiding verplaatst kunnen worden.

Men heeft dan minder buizen noodig, terwijl op deze wijze tevens regelmatig doorgewerkt kan worden. Voor besparing op de buisleiding moet zooveel mogelijk gezorgd worden, want de aanleg is vrij duur. Tegenover de hooge aanlegkosten staat echter het voordeel, dat het vloeistoftransport niets kost, terwijl juist bij rijdbare sproeimachines, vooral als het water van een ver verwijderd punt gehaald moet worden, het tijdverlies groot is.

De wijdte der buizen hangt af van de lengte van het buizenstelsel. Ook op het verstverwijderde gedeelte moet men een voldoende druk hebben.

Met het oog op het drukverlies in de buizen moet bij stationaire sproeimachines, vooral als ook hoogstammen bespoten moeten worden, een motor met grootere capaciteit gebruikt worden.

Men dient buizen te gebruiken, die aan de binnenzijde verlood zijn, opdat zoowel Bordeauxsche als Californische pap verspoten kan worden.

De motor plaatst men op een punt, dat zich het best daarvoor leent, liefst dicht bij het water, zoodat onnoodig transport vermeden wordt.

Om voortdurend te kunnen spuiten dient men twee groote reservoirs te hebben, die om beurten met de pomp verbonden kunnen worden of één groot reservoir, dat steeds met de pomp verbonden blijft en één kleiner reservoir, waarin de sproeivloeistof wordt klaargemaakt en waaruit men de klaargemaakte vloeistof naar het groote reservoir kan laten vloeien.

De hoeveelheid vloeistof in het kleine reservoir moet dan ongeveer gelijk zijn aan de hoeveelheid, die tijdens het klaarmaken verspoten wordt.

Terwijl voor rijdbare spuiten uitsluitend benzinemotoren gebruikt worden, kan men voor de vaststaande machines met succes electromotoren gebruiken.

Bij den Heer Blokland te Hees is een dergelijke motor gemonteerd. Pl. V, fig. 13, geeft een afbeelding van de installatie.

Men ziet in fig. 14 alleen de pomp met het drijf wiel, dat door een riem met den motor verbonden is. In fig. 13 ziet men de pomp (links) en het reservoir (rechts). Onderaan bevindt zich de buis, die het reservoir met de pomp verbindt, daarboven ziet men de persleiding, die door het dak van de schuur naar buiten gaat. Het hoogste punt van de buisleiding bevindt zich hier dicht bij de pomp. Blijkbaar is deze opstelling beter dan bij een montage, waarbij het hoogste punt van de buisleiding ver van de pomp verwijderd is.

Het toerental van den motor zou door een weerstand geregeld

kunnen worden. Als de druk in den windketel te hoog wordt, wordt de veiligheidsklep, tusschen vliegwielen en pomp zichtbaar, gelicht; dan blijft de overtollige vloeistof in de pomp circuleeren, er wordt dus geen vloeistof naar het reservoir teruggepompt.

Het circuleeren van vloeistof in de pomp mag korten tijd, b.v. bij het sluiten der sproeikranen, plaats hebben, een voortdurend circuleeren moet echter vermeden worden, o.a. door het toerental van den motor te verlagen of de sproeiopeningen te verwijderen.

Het voordeel van electro-motoren is, dat zij bedrijfszekerder zijn dan benzine-motoren. Bij deze laatste komen wel eens storingen voor.

**Sproeimachines zonder motoren.** Om de onzekerheid van motoren te ontgaan zijn wel installaties geconstrueerd, waarbij noch motoren noch pompen noodig zijn en de druk verkregen wordt uit cylinders samengeperste lucht. Het moet nog blijken of deze sproeimachines zullen voldoen. Voor kleinere bedrijven met uitsluitend struikvormen, die onder een druk van  $\pm 5$  atm. bespoten kunnen worden, zullen zij wellicht niet ongeschikt zijn.

Door de fa. Gebrs. de Kroes te Overschie is destijds een andere installatie in den handel gebracht, waarbij wel een motor met luchtcompressor gebruikt wordt. De samengeperste lucht wordt in een windketel verzameld; van daaruit gaan twee slangen, één naar de vloeistoftank, welke dus onder druk staat ten einde de vloeistof over een langen afstand te verplaatsen of hoog te kunnen opvoeren, de andere slang voert de lucht direct naar een pistool. Daar wordt de lucht gemengd met de vloeistof, die nu als een nevel het pistool verlaat; een bijzondere fijne verstuiving wordt daardoor verkregen. Ook hier zou de motor met luchtcompressor waarschijnlijk door cylinders samengeperste lucht vervangen kunnen worden.

**Loonsproeierij.** Een groot aantal motorsproeimachines is in gebruik bij de loonsproeiers, d.z. personen, die van het bespuiten van vruchtboomen een bedrijf gemaakt hebben.

Verschillende fruittelers, die vroeger hun boomen niet of zeer onvoldoende bespoten, laten nu de bespuitingen door een loonsproeier uitvoeren. Ongetwijfeld is door de loonsproeierij de bestrijding van plantenziekten in de fruitteelt zeer toegenomen.

Een voordeel van de loonsproeierij is, dat de bespuitingen door ervaren spuiters worden uitgevoerd, de behandeling der boomen is daardoor in vele gevallen beter dan wanneer de bespuitingen door personeel van den fruitteler (boer) zouden zijn uitgevoerd.

Er zijn echter ook nadeelen.

De loonsproeier heeft, als bedrijfsleider, de neiging, zooveel mogelijk bespuitingen aan te nemen; het kan gebeuren, dat er



door ongunstige weersgesteldheden slechts weinig geschikte spuitdagen zijn en dan kunnen niet alle opdrachten worden uitgevoerd.

Er zijn loonsproeiers, tot een groep vereenigd, die overeenkomen zijn in dergelijke gevallen elkander bij te staan. Het bezwaar wordt dan grootendeels ondervangen.

Een ander bezwaar is, dat de loonsproeiers juist door den drang om op tijd klaar te komen ook onder minder gunstige weersomstandigheden zullen spuiten. Zoo worden b.v. carbolineumbesputtingen uitgevoerd als de boomen nat zijn en nog vrij laat in den middag, zoodat de boomen lang vochtig blijven en dan is de kans op knopbeschadiging zeer groot.

Doordat de loonsproeiers bij een groot aantal fruittelers moeten spuiten, kunnen zij niet bij iedereen op het meest geschikte tijdstip spuiten, bij den een wordt iets te vroeg, bij een tweede juist op tijd, en bij een derde eigenlijk wat te laat gespoten.

Dit bezwaar geldt ook in boomgaarden met een groot aantal soorten, die niet gelijk bloeien. Een fruitteler met eigen sproeimachine kan de verschillende soorten op verschillende tijdstippen bespuiten, een loonsproeier zal ze alle op hetzelfde tijdstip behandelen.

Voor bedrijven, welke te klein zijn voor een eigen sproeimachine, is de loonsproeierij wel een geschikt systeem voor de plantenziektenbestrijding.

## V. BEREKENING DER SPUITKOSTEN <sup>1)</sup>

Als voorbeeld zal genomen worden een boomgaard-complex van 10 ha.

De bezitter kan zelf een motor aanschaffen of het spuitwerk door loonsproeiers laten verrichten.

Een rijdbare motorsproeimachine kost f 500 à f 1500. Na  $\pm 10$  jaar zal deze versleten zijn, voor afschrijving moet derhalve f 50 à f 150 in rekening gebracht worden, voor onderhoud zal men gemiddeld  $\pm f 100$  per jaar moeten bestemmen.

Voor het bespuiten van 10 ha boomgaard heeft men, aannemende dat per dag  $2\frac{1}{2}$  ha behandeld wordt (in den regel kan men per dag een grooter oppervlak bespuiten), dus 4 dagen noodig.

Voor een goede behandeling zijn noodig: één carbolineumbe-

<sup>1)</sup> De prijzen voor sproeimachines en bestrijdingsmiddelen varieeren. Bij de berekening der kosten neme men het volgende als leidraad en bringe men de verschillende posten in overeenstemming met de prijzen, die men op een gegeven moment moet betalen.

sputing, één besputing met Bordeauxsche pap en minstens vier besputingen met Californische pap. Er dienen dus zes besputingen te worden uitgevoerd, waarvoor men ongeveer 25 spuitdagen kan rekenen; per dag wordt 10 uur gewerkt.

Het benzineverbruik is 1 à  $1\frac{1}{2}$  liter per uur, voor de volledige besputing van 10 ha heeft men ongeveer 250 à 375 liter benzine nodig. De benodigde hoeveelheid olie bedraagt ongeveer het tiende gedeelte hiervan, dus  $\pm$  25 à 40 liter.

Bij een benzineprijs van 12 cent per liter en een olieprijs van 60 cent per liter, heeft men voor 10 ha per jaar dus een uitgave aan benzine en olie van  $\pm$  f 45 à f 70.

Er zal dagelijks met twee man gewerkt moeten worden, terwijl één paard nodig is voor het voortrijden van de sproeimachine. De kosten van personeel en paard op f 10 per dag stellende, komt men tot een bedrag van  $\pm$  f 250 per jaar als arbeidsloon. (Een boomgaardbezitter, die zelf paarden bezit en zelf personeel in dienst heeft, die voor het spuiten dus geen extra loon behoeft uit te geven, zal deze post niet in rekening brengen.)

Aangenomen mag worden dat gemiddeld per ha 70 flinke fruitboomen staan. Bij de carbolineumbesputing zal per boom 40 à 50 liter vloeistof verbruikt worden, voor 700 boomen (10 ha) heeft men dus  $\pm$  30.000 liter vloeistof nodig. Wordt een  $7\frac{1}{2}\%$  oplossing gebruikt, dan verspuut men 2000 liter vruchtboomcarbolineum, welke, berekend à f 8 per 100 liter  $\pm$  f 160 kosten.

Een eenmalige besputing met Bordeauxsche pap eischt  $\pm$  25.000 liter vloeistof. Voor een  $1\frac{1}{2}\%$  pap is 375 kg kopersulfaat nodig, waarvan de prijs  $\pm$  f 175 bedraagt. Kalk is zoo goedkoop, dat men de uitgave daarvoor practisch kan weglaten.

Voor een viermalige besputing met Californische pap heeft men 100.000 liter vloeistof nodig. Spuit men met gemiddeld 1%, dan is daarvoor 1000 liter Californische pap nodig, de prijs hiervan bedraagt  $\pm$  f 70.

Bij de eerste Californische pap besputing, uitgevoerd direct na den bloei, voegt men in den regel loodarsenaat aan de sproei-vloeistof toe (3 kg per 1000 liter vloeistof). Voor 10 ha is 75 kg nodig, waarvan de prijs  $\pm$  f 60 bedraagt.

In totaal heeft men voor 10 ha derhalve per jaar een uitgave aan sproeikosten:

afschrijving machine . . . . .	f 50 à f 150
onderhoud . . . . .	- 100 - 100
benzine en olie . . . . .	- 45 à - 70
arbeidsloon . . . . .	- 250 - 250
bestrijdingsmiddelen . . . . .	- 365 - 365

---

f 860 à f 935

Vrij ruw geschat kost een volledige bespuiting dus  $\pm$  f 85 à f 100 per ha. Laat men de carbolineumbespuiting achterwege (wat in sommige jaren bij peren mogelijk is) en spuit men alleen tegen de schurftziekte en wormstekigheid, dan zijn de totaal uitgaven per 10 ha  $\pm$  f 200 lager. Dan zijn de kosten per ha dus ongeveer f 60 à f 80.

Wordt de bespuiting door loonspuiters uitgevoerd, dan wordt  $\frac{1}{2}$  à 1 cent per liter verspoten vloeistof berekend. Aan spuitloon bij een volledige bespuiting ( $6 \times$  spuiten) eischt dit een bedrag van f 750 à f 1500 of per ha  $\pm$  f 75 à f 150. Daarbij komen dan nog de kosten voor de bestrijdingsmiddelen. Voor groote bedrijven is het voordelig een eigen machine aan te schaffen, kleinere bedrijven kunnen voorloopig beter de bespuiting door loonsproeiers laten uitvoeren. Het valt moeilijk aan te geven, waar de grens ligt, daar kleinere bedrijven intensiever gedreven worden (ondercultures). In dergelijke bedrijven neemt het vloeistof-verbruik per ha belangrijk toe en daarmee stijgen ook de uitgaven aan den loonsproeier. Ieder fruitteler moet voor zijn eigen bedrijf vooraf berekenen wat voordeliger is, het aanschaffen van een sproeimachine of de uitvoering van de bespuitingen door een loonsproeier.

De prijzen der motorsproeimachines zijn zoo verlaagd, dat ook kleinere bedrijven een eigen, zij het dan kleinere, machine kunnen bezitten.

Bij de berekening kunnen de volgende gegevens gebruikt worden:

	Vloeistofgebr. bij carbolineum- bespuiting	Vloeistofgebr. bij Bord. of Cal. pap-bespuiting
Hoogstamappel... kroondoorsnede $\pm$ 8 m	30 à 40 liter	20 à 25 liter
Hoogstamappel... kroondoorsnede $\pm$ 4 m	15 à 20 „	10 liter
Hoogstampeer ... stamomvang 40 cm	20 à 25 „	15 „
Flinke pyramide . hoogte $\pm$ 4 m	20 à 25 „	15 „
Boomgaard ..... doorsnede 2 m	2 à 3 „	2 „
Bessenstruik ..... per ha	$\pm$ 3000 „	$\pm$ 2000 liter

Zooals reeds op blz. 52 is aangegeven, kan men in kleinere bedrijven in plaats van een rijdbare machine een vaststaande gebruiken. De aanschaffingskosten zijn dan lager, ook het onderhoud zal bij een goede opstelling, b.v. in een schuur, minder vergen.

Is men op grond van berekeningen en overwegingen tot de conclusie gekomen, dat het aanschaffen van een sproeimachine

de voorkeur verdient boven de uitvoering van de bespuitingen door een loonsproeier, dan rijst de vraag, welke machine gekocht moet worden.

De beantwoording van deze vraag is uiterst lastig, daar men eerst door jarenlange ervaringen voldoende gegevens verkrijgt voor een juiste beoordeeling.

Het is voorloopig alleen mogelijk algemeene richtlijnen te geven:

1° De installatie moet, in verband met den aard van het bedrijf, zoo doelmatig mogelijk zijn. In boomgaarden, waar op vele plaatsen water aanwezig is, verdient een machine met klein reservoir de voorkeur (slechts één paard noodig; tijd, welke met vullen verloren gaat, vrij gering); is slechts op één punt water te verkrijgen, dan dient men een machine met groot reservoir te nemen, wel heeft men dan twee paarden noodig, doch men spaart veel tijd uit, omdat men minder vaak behoeft te vullen.

2° Bij onderbeplanting van aardappels of bieten zal men een breede machine verkiezen, bij een ondercultuur van bessen is waarschijnlijk een smalle machine beter. In sommige gevallen zal een hooge machine beter voldoen dan een lage. Met tweewielige machines kan men gemakkelijk wenden, zij eischen een vasten grond.

3° Vaststaande machines zijn geschikt voor niet te groote bedrijven en voor lange, smalle perceelen.

4° Voor boomgaarden, vooral met hooge en breede boomen, heeft men een krachtige machine en pompen met groote capaciteit noodig. In fruittuinen met kleine en lage struiken kan men lichtere motoren en pompen met geringer vloeistofverplaatsing gebruiken.

5° Het is niet de hoofdzaak in korten tijd veel vloeistof te verspuiten, maar om de boomen goed en van alle kanten te raken.

6° De machines moeten zoo eenvoudig en solide mogelijk gebouwd zijn; een eenvoudige bediening is gewenscht, opdat ook weinig technisch onderlegde personen er mede kunnen werken.

7° De onderdeelen moeten bestand zijn tegen de verschillende sproeivloeistoffen, gummi-onderdeelen moeten met het oog op de carbolineumbespuitingen zooveel mogelijk vermeden worden. Waar kogels als kleppen dienst doen, moeten deze liefst ook van metaal zijn.

8° Onderdeelen moeten spoedig leverbaar zijn en gemakkelijk aangebracht kunnen worden; tijdens het sproeien moet er zoo weinig mogelijk stagnatie zijn.

9° Men moet letten op het gewicht van de machine. De geheel met vloeistof gevulde machine moet nog goed door den boom-

gaard verplaatst kunnen worden. Hoe zwaarder de machine is, hoe breeder ook de velgen moeten zijn (lieft wielen met luchtbanden gebruiken); groote wielen zijn vooral in boomgaarden met greppels beter dan kleine wielen. Bij de vierwielige machines moeten, om goed te kunnen wenden, de voorwielen onder het chassis kunnen doordraaien.

10° De vloeistof moet gemakkelijk uit de pomp verwijderd kunnen worden (aftappen, uitblazen). Blijft er vloeistof in de pomp staan, dan is 's winters de kans zeer groot, dat de cylinders stuk vriezen.

Behalve op deze punten van technischen aard is het wel goed hier op één zuivere handelskwestie te wijzen.

Het verdient aanbeveling bij aankoop van een motorsproeimachine in de koopovereenkomst de capaciteit van motor en pomp te vermelden. Mocht later twijfel over de capaciteit ontstaan, dan kan door berekening nagegaan worden of de geleverde machine aan de overeenkomst voldoet.



## VERKLARING DER AFBEELDINGEN

### PLAAT I

- Fig. 1. Rugpolverisateur met handpomp.  
„ 2. Handpulverisateur (automatisch).  
„ 3. Groote automatische rugpulverisateur.  
„ 4. Tonspuit.

### PLAAT II

- Fig. 5. Batterijspuit.  
„ 6. Week's rijdbare sproeimachine.  
„ 7. Sproeigeweel met druksluiting.  
„ 8. Sproeigeweel met draaibaar handvat voor de sluiting.

### PLAAT III

- Fig. 9. Aardappelsproeimachine.  
„ 10. Meervoudige verstuiver.

### PLAAT IV

- Fig. 11. Sproeien in de kas.  
„ 12. Sproeien op het veld.

### PLAAT V

- Fig. 13. Vaste motorpompinstallatie; links pomp, rechts reservoir.  
„ 14. Electrisch gedreven motorpomp, op vorige afbeelding links zichtbaar.

### PLAAT VI

- Fig. 15. Platz motorsproeimachine.  
„ 16. Hardie motorsproeimachine.

### PLAAT VII

- Fig. 17. Bean motorsproeimachine.

### PLAAT VIII

- Fig. 18. Sproeien in den boomgaard.

De cliché's van de afbeeldingen 5 en 15 werden ons welwillend afgestaan door de fa. PLATZ, Ludwigshafen (Duitschland), de cliché's van de afbeeldingen 8 en 16 ontvingen wij in dank van de fa. KEMPKE en WATERREUS te Elst en de cliché's van de afbeeldingen 10, 17 en 18 van den Heer VAN HEIJST te Utrecht.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

PLAAT IV



Fig. 11



Fig. 12





Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15




Fig. 16





Fig. 17





## PUBLICATIES VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST

verkrijgbaar tegen den hieronder vermelden prijs bij den Inspecteur, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen — Postrekening 18018.

### VLUGSCHRIFTEN:

Prijs 4 cts per stuk plus verzendkosten, bedragende voor 1 ex. 2 cts, 10 ex. 4 cts  
50 ex. 15 cts.

1. Bladluizen.
2. Schildluizen.
3. Bladaaltjes.
4. Resultaten van proeven met Californische pap.
5. Sproei- en Stuwwerktuigen.
6. Bordeauxsche pap en Normaalpappoeder.
7. Californische pap.
8. Carbolineum en eenige andere sproeimiddelen tegen dierlijke parasieten.
9. Selderieziekten.
10. Koolziekten.
11. Eenige Rhododendron-vijanden.
12. Eenige belangrijke rozenvijanden.
13. De kankerziekte der ooftboomen.
15. De fritvlieg.
17. De bessenbladwesp.
19. Het stengelaaltje.
20. Het bieten- of haveraaltje.
21. Het wortelaaltje.
22. Graanroest.
23. Vlekken- en *Macrosporium*ziekte der boonen.
24. Vlekkenziekte der erwten.
25. Bietenwortelbrand.
26. Aaltjesziekten in bolgewassen.
27. Aardappelwratziekte.
28. Rondknop bij zwarte bessen.
29. Bloedluis.
30. De slakvormige bastaardrups der ooftboomen.
31. Beukenwolluis.
32. De zgn. „meeldauw” der tomaten.
33. De eizen- en wilgensnuittor (*Cryptorrhynchus lapathi* L.).
34. Wilgenhaantjes.
35. Iepenspinkevers.
36. Het spint (roode spin).
37. De klaverkanker.
38. Pokziekte van het pereblad.
39. Bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw.
40. De bestrijding der emelten.
41. Ontsmetting van aardappelen met sublimaat.
42. Drinkbakken voor vogels en andere dieren.
43. De bietenvlieg (*Anthomyia conformis* Fall = *Pegomyia hyoscyami* Panz.).
44. Thrips.
45. Iets over de betekenis van de vogels voor onze cultures.
46. De steenrups der prulmen.
47. De Coloradokever.

### MEDEDEELINGEN:

1. De spuitvretter of knopworm der bessestruiken. 4e dr. f 0,35.
2. De roode worm der frambozen. 3e dr. f 0,35.
3. De trekmaed. 3e dr. f 0,25.
4. Brandziekten van granen. 3e dr. f 0,30.
5. Dopluis op perzik en druif. 2e dr. f 0,25.
6. Aardappelziekten, waarmede rekening moet worden gehouden bij de veldkeuring en bij de selectie. 6e dr. f 0,30.
- 6a. Guide pour l'inspection aux champs et pour la sélection des pommes de terre. f 0,40.
7. Insectenschade op gescheurd grasland in 1918. 2e dr. f 0,15.
8. De koolvlieg (*Chorthippa brassicae* BEHE). 2e dr. f 0,25.
9. Ziekten van aardappelknollen. 5e dr. f 0,25.
10. De loodglansziekte onzer ooftboomen. 3e dr. f 0,20.
11. Plantenziekten, waarmede rekening moet worden gehouden bij de veldkeuring. 2e dr. f 0,20.
12. Verslag over de werkzaamheden van den Phytopathologischen Dienst in het jaar 1919. Uitverkocht.
13. Le service phytopathologique aux Pays-bas 2e éd. f 0,15.
- 13a. The Phytopathological Service in the Netherlands. 3rd éd. f 0,25.
- 13b. Statens Plantepatologisk kontor I Nederlandene. f 0,15.
- 13c. El Servicio fitopatológico en los Países Bajos. f 0,15.
14. De bescherming van den mol. Uitverkocht.
15. Proefnemingen met rook, ter bescherming van gewassen tegen nachtvorsten. Uitverkocht.
16. De aardappelwratziekte. 2e dr. f 0,25.
- 16a. Black scab (wart disease) in the Netherlands. f 0,25.
- 16b. La maladie verruqueuse (gale-noire) des pommes de terre aux Pays-Bas. f 0,25.
- 16c. Der Kartoffelkrebs in den Niederlanden. f 0,25.
17. Vogelcultuur door middel van nestkasten. 6e druk. f 0,25.
18. Plantenziektenkundige waarnemingen I: Iepenziekte, Cattleeyevertje, Tarweontsmetting. Uitverkocht.
19. Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen I. 3e dr. f 0,25.
20. Wormstekigheid bij appel en peer. 3e dr. f 0,25.
21. Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen II. 2e dr. f 0,25.
22. Plantenziektenkundige waarnemingen II. Gezondheidstoestand van te velde gekleurde aardappelen. — Gaa aan *Arabis alpina*. — Vogelcultuur in fruittuinen. f 0,35.
23. De strepenziekte van de gerst. f 0,30.
24. Plantenziektenkundige waarnemingen III: Iepenziekte. — *Chlorocystis rectangularata*. f 0,45.
25. Bestrijding van tomatenziekten in Engeland (reisverslag). f 0,15.
26. Ziekten en beschadigingen van tomaten. 2e dr. f 0,45.
27. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in de jaren 1920 en 1921. f 1,—.
28. Plantenziektenkundige waarnemingen IV: Over emelten. f 0,45.
29. De groote en de kleine Narcisvlieg. f 0,10.
30. Vogelcultuur en Vogelstudie 1922. f 0,35.
31. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1922. f 0,45.
32. Het vroeg roelen van aardappelen voor pootgoed en de bewaring in moderne pootaardappelbewaarplaatsen. 2e dr. f 0,15.



33. Sproelen en Sproeiërs, 5e dr. f 0,40.
34. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1923. f 0,60.
35. Plantenziektenkundige waarnemingen V: Kool: Rotstronken, Stippel- en Randjeskool. f 0,50.
36. De Plantenziektenkundige Dienst in Nederland, 2e dr. f 0,55.
37. De herdenking van het 25-jarig bestaan van den Plantenziektenkundigen Dienst, 29 November 1924. Uitverkocht.
38. De Spreeuw. f 0,15.
39. De Roek in Nederland. f 0,15.
40. Onderzoek naar de vatbaarheid van aardappelsoorten voor de wratsiekte in de jaren 1922-'24. f 0,20.
41. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1924. f 0,50.
42. Plantenziektenkundige waarnemingen VI: Een studie over emelten. f 1,40.
43. Middelen tegen plantenziekten en schadelijke dieren in land- en tuinbouw. 3e dr. f 0,20.
44. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1925. f 0,90.
45. Smalle graanvlieg en fritvlieg. f 0,25.
46. De berichtendienst van den Plantenziektenkundigen Dienst. f 0,15.
47. Aantasting van sulkerbieten en mangelwortelen door *Phoma betae* Frank. f 0,25.
48. Het blauw-worden van aardappelen. f 0,25.
49. Insectenbestrijding uit vliegtuigen. f 0,60.
50. De schurftziekte bij appel en peer. 3e dr. f 0,20.
51. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1926. f 0,80.
52. De aardappelziekte (*Phytophthora infestans*), 2e dr. f 0,15.
53. Een waarschuwingdienst voor het optreden van de aardappelziekte. f 0,10.
54. Draaihartigheid bij kool. f 0,20.
55. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1927. f 0,80.
56. Plantenziektenkundige waarnemingen VII: Knopvraat v. meezen aan roode bes. — Milten aan Komkommer. — Randjesziekte roode bes, Gele Hortensia's. — Tomatenkanker. f 0,20.
57. Rapport over de middelen ter voorkoming van schade door spreuwen in boomgaarden en fruittuinen. f 0,10.
58. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1928. f 0,80.
59. Rupsenplagen: Bastaardsatijnvlinder, plakker, ringelrups, satijnvlinder en spinselmot. 3e dr. f 0,30.
60. Plantenziektenkundige waarnemingen VIII: De iepenziekte en de iepenspintkevers. — Eenige oude gegevens over ziekten in boomen (vnl. in iepen). f 0,35.
61. Vermeende en werkelijke gevaren verbonden aan het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. f 0,20.
62. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1929. f 1,20.
63. Grondontmetting. f 0,35.
64. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1930. f 1,40.
65. Studie over vogels en hun omgeving. f 0,65.
66. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1931. f 1,10.
67. Bestuiven en bestuivers. f 0,25.
68. De Coloradokever. f 0,20.
69. Bijdrage tot de biologie en de ecologie van den Spreeuw (*Sturnus vulgaris* L.) gedurende zijn voortplantingstijd. f 1,—.
70. Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bessen, frambozen, aardbeien). f 0,35.
71. Rapport inzake het onderzoek der vliegenplaag op de stortplaats van het Haagsche stadsvuil te Wijster. f 0,20.
72. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1932. f 1,10.
73. Sproelschema voor fruitboomen. 3e dr. f 0,10.
74. Onderzoek over de karwijmot (*Depressaria nervosa* Hw) en haar bestrijding. f 0,30.
75. Het spreuwendraagstuk voor de fruitteelt. f 0,15.
76. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1933. f 0,75.
77. Beschrijving van de knollen en de lichtkiem van aardappelrassen. f 0,40.
78. Voorloopige mededeeling over de resultaten der proefnemingen met chemische middelen ter bestrijding der Karwijmot (*Depressaria nervosa* HW.) in 1934. f 0,15.